

意見書（医師記入）

なかよし保育園 施設長殿

園児氏名 _____

病名〔 _____ 〕

症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので _____ 年 _____ 月 _____ 日から登園可能と判断します。

_____ 年 _____ 月 _____ 日

医療機関 _____

医師名 _____

印又はサイン _____

※かかりつけ医の皆様へ

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、下記の感染症については、意見書の提出をお願いします。

感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育園生活が可能となる状態となつてからの登園であるよう、ご配慮下さい。

○医師が記入した意見書が必要な感染症

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
インフルエンザ	症状がある期間(発症前 24 時間から発症後 3 日程度までが最も感染力が強い)	発症後 5 日を経過し、かつ解熱した後 3 日を経過してから
新型コロナウイルス	発症後の 5 日間が特に他人に感染させるリスクが高い	発症日を0日目として有症状の場合は7日間、無症状の場合は5日間経過してから
百日咳	抗菌薬を使用しない場合、咳の出現後 3 週間を経過 するまで	特有の咳が消失し、全身状態が良好であること(抗菌薬を決められた期間服用する。7 日間服用後は医師の指示に従う。)
はしか(麻疹)	発しん出現の前 7 日間から後 7 日間くらい	解熱後 3 日を経過してから
おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)	発症 3 日前から耳下腺腫脹後(耳の後ろから顎にかけての腫れ)	耳下腺の腫れが消失してから
三日はしか(風疹)	発しん出現の前 7 日間から後 7 日間くらい	発しん(ぶつぶつ)が消失してから
水ぼうそう(水痘)	発しん出現 1~2 日前から痂皮(かさぶた)形成まで	すべての発しんがかさぶたになってから
プール熱(咽頭結膜炎) 【原因ウイルス:アデノウイルス】	発熱、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え、2 日してから
流行性角結膜炎 【原因ウイルス:アデノウイルス】	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いいため、結膜炎の症状が消失して、2 日してから