

ジアゼパム



奈良県立医科大学
Nara Medical University

diazepam

基本情報

JLAC10	分析物	3L130	ジアゼパム	JLAC11 (暫定案)	測定物	D2231	ジアゼパム
	識別	0000			識別		
	材料	023	血清		材料		
	測定法	204			測定法		

診療報酬	第 2 章 特掲診療料		第 1 部 医学管理等	0
	特定薬剤治療管理料			
	B001	特定疾患治療管理料		
	02B001 02 のロ	特定薬剤治療管理料(てんかん患者であって抗てんかん剤を投与しているもの)		0

検査オーダー・検体採取

患者同意に対する 要求事項	
検査結果に影響を 与える検査情報	
オーダーボタン	
検査予約	
至急オーダー	
時間外オーダー	
検査予約・オーダー	
患者の検査前準備	
検体採取のタイミング	

記号	添加物(キャップ色等)・ 採取容器	採取材料	採取量	測定材料	検体ラベル(単項目オーダー時)
111	外注プレーン採血管	血液	1.50	血清	31-9001 1 / 1 [1] イダイ タロウ S 00001-2345-6 **** 111 ****  111 外注プレーン採血管 1.50 mL 茶 血液

採取容器について	
検体採取について	
検体搬送について	
病棟での検体保存方法	
再検査・追加検査の対応可能日数	
検査不可検体について	

9616

0

2020/6/1

ジアゼパム



diazepam

検査結果報告

測定機器	HPLCシステム
検査所要日数	3~5
検査部門	外部委託 [SRL]

採血容器についての注意事項 血清分離剤入り容器の使用は避けてください。薬物検査において、測定値に影響を及ぼす場合があります。採血時刻についての注意事項 1. TDM(血中薬物濃度モニター)における採血時間です。2. 連続投与においては定常状態到達後、採血を行ってください。3. 中毒時はPeak濃度も測定する必要があります。4. 標準的な時間であり、患者状況にあわせて採血するのが望ましいと思われます。採血時刻 次回投与直前(Trough濃度)ただし、抗てんかん剤として用いる場合N-デスメチルジアゼパムも同時報告いたします。セルシン、ホリゾン、ソナコン、ジアパックス

基準値

期間	基準値設定材料	血清		
測定方法	オクタロニー法			
	項目	男性	女性	単位
1	ジアゼパム	なし	なし	なし

緊急異常値

電話連絡・苦情対応

9616

0

2020/6/1

ジアゼパム



diazepam

臨床情報

臨床的意義

ジアゼパムはbenzodiazepine (BDP) 系薬物で, 抗不安作用, 催眠作用, 抗痙攣作用および筋弛緩作用を有する薬剤である。ジアゼパム (DZP) の主代謝物はN-デスメチルジアゼパムで薬理活性をもち神経症やうつ病をはじめ, 種々の疾患に伴う不安, 緊張, 抑うつ, 筋緊張の軽減, あるいは麻酔前薬として用いられる。また, 静注は作用発現が速やかで作用時間が短いことから, てんかんの重積状態の抑制に有用性が高い。

異常値を示す病態・疾患

関連項目

参考文献

変更履歴

2016 年 4 月 1 日	平成 28 年 4 月診療報酬改定
2018 年 4 月 1 日	平成 30 年 4 月診療報酬改定
2019 年 6 月 1 日	電子カルテ更新に伴う依頼手順変更改定

URL <http://test-guide.srl.info/hachioji/>