

D I ニュース

薬剤部 薬品情報係

新規採用医薬品通知

薬品名	効能・効果	備考
ディビゲル1mg DIVIGEL1mg 持田 1包:エストラジオール 1mg 薬価収載日:2007. 9 薬価 1包:63.70 薬効分類コード 2473 エストラジオール軟膏(ゲル)剤	更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う血管運動神経症状 (Hot flush 及び発汗)	禁 エストロゲン依存性腫瘍(例えば乳癌、子宮内膜癌)及びその疑いのある患者、乳癌の既往歴のある患者、血栓性静脈炎や肺塞栓症のある患者、又はその既往歴のある患者、動脈性の血栓塞栓疾患(例えば、冠動脈性心疾患、脳卒中)又はその既往歴のある患者、本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者、妊婦又は妊娠している可能性のある女性及び授乳婦、重篤な肝障害のある患者、診断の確定していない異常性器出血のある患者、ポルフィリン症で急性発作の既往歴のある患者 注 子宮筋腫を有する患者、子宮内膜症のある患者、乳癌家族素因が強い患者、乳房結節のある患者、乳腺症の患者又は乳房レントゲン像に異常がみられた患者、高血圧、心疾患、腎疾患のある患者、又はその既往歴のある患者、糖尿病患者、片頭痛、てんかんの患者、肝障害のある患者、術前又は長期臥床状態の患者、全身性エリテマトーデスの患者 相 ◆ ↓ リファンピシン、抗てんかん剤、フェノバルビタール、フェニトイン、カルバマゼピン、HIV 逆転写酵素阻害剤、エファビレンツ、ネビラピン、セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品、ステロイドホルモン☆:リトナビル、ネルフィナビル等 副 ■ アナフィラキシー様症状 静脈血栓塞栓症、血栓性静脈炎
	用法・用量	
	通常、成人に対しディビゲル1mg(エストラジオールとして1mg含有)1包(1.0g)を1日1回左右いずれかの大腿部もしくは下腹部に、約400cm ² の範囲に塗布する。	
薬品名	効能・効果	備考
ロキソニンテープ100mg LOXONIN TAPE 50mg 第一三共 1枚:ロキソプロフェンナトリウム水和物 56.7mg (無水物として 50mg)	下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 変形性関節症、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛	禁 本剤の成分に過敏症の既往歴のある患者、アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作の誘発)又はその既往歴のある患者 注 ■ 気管支喘息の患者
	用法・用量	
	1日1回、患部に貼付する	

効能・効果追加 通知

アクトス錠 30

2型糖尿病 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用

通常、成人にはピオグリタゾンとして15mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与する。なお、性別、年齢、症状により適宜増減するが、30mgを上限とする

ガスモチン錠 5mg

経口腸管洗浄剤によるバリウム注腸 X 線造影検査前処置の補助

通常、成人には経口腸管洗浄剤の投与開始にモサプリドクエン酸塩として20mgを経口腸管洗浄剤(約180mL)で経口投与する。また、経口腸管洗浄剤投与後、モサプリドクエン酸塩として20mgを少量の水で経口投与する。

その他の変更通知

オーグメンチン錠 250

アルミ袋開封後1ヶ月以内の使用が推奨されているので、処方数量・日数に注意してください。

	従来品	変更品
PTP 材質	PP：ポリプロピレン	PVC：ポリ塩化ビニル
PTP 中の錠数	10 錠	6 錠
アルミ袋中のシート数	10 シート	1 シート
注意	—	アルミ袋開封後 1ヶ月以内 に使用すること