

D I ニュース

薬剤部 薬品情報係

新規採用医薬品通知

(薬品名)	アボルブカプセル 0.5mg	劇	市販直後調査 平成21年9月～平成22年3月
(英名)	AVOLVE CAPSULES 0.5mg		
(規格・含有量)	0.5mg/Cap 1Cap中にデュタステリド 0.5mgを含有		
(一般名)	デュタステリド		
(メーカー名)	グラクソ・スミスクライン		
【薬価収載日】	2009年9月		
【薬価】	206.50/Cap		
【薬効コード】	87 249		
【薬効分類名】	その他のホルモン剤		
効能・効果	前立腺肥大症		
用法・用量	通常、成人にはデュタステリドとして1回0.5mgを1日1回経口投与する。		
禁忌	本剤の成分及び他の5 α 還元酵素阻害薬に対し過敏症の既往歴のある患者 女性[「重要な基本的注意」及び「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照] 小児等[「重要な基本的注意」及び「小児等への投与」の項参照] 重度の肝機能障害のある患者[本剤は主に肝臓で代謝されるため、血中濃度が上昇するおそれがある]		
相互作用	本剤作用増強 CYP3A4阻害作用を有する薬剤(リトナビル等)		
副作用	勃起不全、リビドー減退、乳房障害(女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感)など		
備考	投与開始初期に改善が認められる場合もあるが、治療効果を判定するには、通常6カ月の治療が必要である。		

(薬品名)	ラジレス錠 150mg	市販直後調査 平成21年10月～平成22年4月
(英名)	RASILEZ TABLETS 150mg	
(規格・含有量)	150mg/錠 1錠中アリスキレン 150mgを含有	
(一般名)	アリスキレン	
(メーカー名)	ノバルティスファーマ	
【薬価収載日】	2009年10月	
【薬価】	168.00/錠	
【薬効コード】	87 2149	
【薬効分類名】	その他 直接的レニン阻害剤	
効能・効果	高血圧症	
用法・用量	通常、成人にはアリスキレンとして150mgを1日1回経口投与する。 なお、効果不十分な場合は、300mgまで増量することができる。	
禁忌	妊婦又は妊娠している可能性のある婦人 シクロスポリンを投与中の患者	
相互作用	禁忌 シクロスポリン(サンディミュン、ネオーラル等) 本剤作用増強 アトルバスタチン 他剤作用減弱 フロセミド 副作用の増強(血清カリウム値上昇) ①カリウム保持性利尿剤(スピロラクトン、トリアムテレン等)、②カリウム補給製剤(塩化カリウム等)、③レニン-アンジオテンシン系阻害剤(アンジオテンシン変換酵素阻害剤、アンジオテンシンII受容体拮抗剤)	
副作用	重大な副作用 血管浮腫、高カリウム血症 その他の副作用 血中トリグリセリド増加、血中尿酸増加、頭痛、下痢、肝機能異常、ALT(GPT)増加、 γ -GTP増加	

(薬品名)	エビリファイ内用液 0.1% 6mL 劇
(英名)	ABILIFY ORAL SOLUTION 0.1%
(規格・含有量)	6mg/6mL(本) 1mL 中アリピプラゾールとして 1mg を含有
(一般名)	アリピプラゾール内用液
(メーカー名)	大塚製薬
【薬価収載日】	2009 年 3 月 23 日
【薬価】	95.40/mL
【薬効コード】	87 1179
【薬効分類名】	精神神経用剤
効能・効果	統合失調症
用法・用量	通常、成人にはアリピプラゾールとして 1 日 6～12mg(6～12mL)を開始用量、1 日 6～24mg(6～24mL)を維持用量とし、1 回又は 2 回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1 日量は 30mg(30mL)を超えないこと。
禁忌	昏睡状態の患者 バルビツール酸誘導体・麻酔剤等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者 アドレナリンを投与中の患者 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
相互作用	禁忌 アドレナリン(ボスミン) 本剤・他剤作用増強 中枢神経抑制剤(バルビツール酸誘導体、麻酔剤等)、 本剤副作用増強・他剤作用増強 ①降圧剤、②抗コリン作用を有する薬剤 本剤作用減弱 ①ドパミン作動薬(レボドパ製剤)、②肝代謝酵素(特に CYP3A4)誘導作用を有する薬剤(カルバマゼピン等) 本剤作用増強 ①アルコール(飲酒)、②CYP2D6 阻害作用を有する薬剤(キニジン等)、③CYP3A4 阻害作用を有する薬剤(イトラコナゾール、ケトコナゾール等)
副作用	重大な副作用 悪性症候群・遅発性ジスキネジア・麻痺性イレウス・アナフィラキシー様症状・横紋筋融解症・糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡・痙攣 その他の副作用 不眠、神経過敏、不安、アカシジア、振戦、筋強剛、食欲不振、プロラクチン低下、ALT(GPT)上昇、CK(GPK)上昇、体重減少 など
備考	オレンジ味。茶葉由来飲料・味噌汁・一部のミネラルウォーター・煮沸していない水道水と混合すると含量低下。

削除医薬品通知

●12月1日より

- ・パーセリン錠 25mg …在庫消尽後削除
- ・トラサコール錠 20mg …削除
- ・ハイゼット細粒 20% 0.5g …削除

適応追加通知

アバステン点滴注射用 100mg/4mL 400mg/16mL	扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはペバシズマブとして1回 15mg/kg(体重)を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。
セイブル錠 25mg・50mg・75mg	糖尿病の食後過血糖の改善 (ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤、 ビグアナイド系薬剤 若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合に限り)
モーラステープ 20mg モーラステープ L 40mg	関節リウマチにおける関節局所の鎮痛
リンデロン注 2mg(0.4%) 4mg(0.4%)	早産が予期される場合における、母体投与による胎児肺成熟を介した新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制 母体投与による新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制に用いる場合、早産が予期される妊娠 34 週までの妊婦に対し、ベタメタゾンとして 1 回 12mg を 24 時間ごとに計 2 回、筋肉内注射する。
フルダラ静注用 50mg	再発又は難治性の低悪性度 B 細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫
フルダラ錠 10mg	貧血又は血小板減少症を伴う慢性リンパ性白血病