

D I ニュース

薬剤部 薬品情報係

新規採用医薬品通知

(薬品名)	ジクアス点眼液 3%	市販直後調査 平成22年12月～平成23年6月
(英名)	DIQUAS ophthalmic solution 3%	
(規格・含有量)	5mL/瓶 1mL 中ジクアホソルナトリウム 30mg 含量	
(一般名)	ジクアホソルナトリウム点眼液	
(メーカー名)	参天製薬	
【薬価収載日】	2010年12月	
【薬価】	623.40円/1瓶	
【薬効コード】	871319	
【薬効分類名】	ドライアイ治療剤	
効能・効果	ドライアイ	
用法・用量	通常、1回1滴、1日6回点眼する。	
禁忌	本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者	
相互作用	-	
副作用	その他 刺激感など	
備考	含水性ソフトコンタクトレンズ装用時の点眼は避けるよう指導すること。	

(薬品名)	エリザスカプセル外用 400μg
(英名)	Erizas Capsule for Nasal spray 400 μ g
(規格・含有量)	本剤は1カプセル中、デキサメタゾンシベシル酸エステル 400 μ g を含有
(一般名)	デキサメタゾンシベシル酸エステルカプセル外用
(メーカー名)	日本新薬
【薬価収載日】	2009年12月
【薬価】	134.50円/1Cap
【薬効コード】	871329
【薬効分類名】	粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
効能・効果	アレルギー性鼻炎
用法・用量	通常、成人には1回1カプセル(デキサメタゾンシベシル酸エステルとして400 μ g)を1日1回専用噴霧器を用いて鼻腔に噴霧する。
禁忌	①有効な抗菌剤の存在しない感染症、全身の真菌症の患者 ②本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
相互作用	-
副作用	重大な副作用 アナフィラキシー様症状(類薬) その他 ALT(GPT)上昇など
備考	専用噴霧器(ツインライザー™)を用い、使用説明書に従って息を止めた状態で鼻腔内に4回噴霧させること

削除医薬品通知

●2月1日より

FAD 点眼液 0.05% 5mL

削除

イリコロン M 配合錠

削除

適応追加通知

<p>オルベスコ 200 μg インヘラー 56 吸入用</p>	<p>(小児への適応追加) 気管支喘息 小児 通常、小児にはシクレソニドとして 100~200 μg を 1 日 1 回吸入投与する。なお、良好に症状がコントロールされている場合は 50 μg/日 1 回まで減量できる。</p>
<p>アルタット Cap75mg</p>	<p>(小児への適応追加) 胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 吻合部潰瘍, 逆流性食道炎, Zollinger-Ellison 症候群 通常、小児にはロキサチジン酢酸エステル塩酸塩として, 体重 30kg 未満では 1 回 37.5mg を, 体重 30kg 以上では 1 回 75mg を 1 日 2 回(朝食後, 就寝前又は夕食後)経口投与する。</p> <p>麻酔前投薬 通常、小児にはロキサチジン酢酸エステル塩酸塩として, 体重 30kg 未満では 1 回 37.5mg を, 体重 30kg 以上では 1 回 75mg を手術前日就寝前及び手術当日麻酔導入 2 時間前の 2 回経口投与する。</p> <p>下記疾患の胃粘膜病変(びらん, 出血, 発赤, 浮腫)の改善 急性胃炎, 慢性胃炎の急性増悪期 通常、小児にはロキサチジン酢酸エステル塩酸塩として, 体重 30kg 未満では 1 回 37.5mg を, 体重 30kg 以上では 1 回 75mg を 1 日 1 回(就寝前又は夕食後)経口投与する。</p>
<p>カロナール細粒 20%</p>	<p>(1) 下記の疾患並びに症状の鎮痛 頭痛, 耳痛, 症候性神経痛, 腰痛症, 筋肉痛, 打撲痛, 捻挫痛, 月経痛, 分娩後痛, がんによる疼痛, 歯痛, 歯科治療後の疼痛, 変形性関節症 通常、成人にはアセトアミノフェンとして, 1 回 300 ~ 1000mg を経口投与し, 投与間隔は 4~6 時間以上とする。なお, 年齢, 症状により適宜増減するが, 1 日総量として 4000mg を限度とする。また, 空腹時の投与は避けさせることが望ましい。</p> <p>(3) 小児科領域における解熱・鎮痛 通常、乳児, 幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして, 体重 1kg あたり 1 回 10~15mg を経口投与し, 投与間隔は 4~6 時間以上とする。なお, 年齢, 症状により適宜増減するが, 1 日総量として 60mg/kg を限度とする。ただし, 成人の用量を超えない。また, 空腹時の投与は避けさせることが望ましい。</p>

