

## D I ニ ュ ー ス

薬剤部 医薬品情報管理係

## 新規採用医薬品通知

|          |  |
|----------|--|
| (薬品名)    | リン酸Na補正液0.5mmol/mL   |
| (英名)     | Sodium Phosphate Corrective Injection 0.5 mmol/mL  |
| (規格・含有量) | 本剤は1管(20mL)中に次の成分を含有する。<br>リン酸水素ナトリウム水和物( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ )1.79g<br>リン酸二水素ナトリウム水和物( $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )0.780g<br>〈電解質組成〉<br>$\text{Na}^+$ 15mEq/20mL<br>Pとして10mmol/20mL(310mg/20mL、15.5mg/mL) |
| (一般名)    | リン酸水素ナトリウム水和物/リン酸二水素ナトリウム水和物   |
| (メーカー名)  | 大塚製薬   |
| 【薬価収載日】  | 2011年3月  |
| 【薬価】     | 136.00円/1管   |
| 【薬効コード】  | 873319   |
| 【薬効分類名】  | 補正用電解質液  |
| 効能・効果    | 電解質補液の電解質補正  |
| 用法・用量    | 電解質補液の電解質の補正用として、体内の水分、電解質の不足に応じて電解質液に添加して用いる。   |
| 禁忌       | —  |
| 相互作用     | —  |
| 副作用      | 紅斑 血中カルシウム減少   |

## 削除医薬品通知

## ●7月1日より

|                     |    |
|---------------------|----|
| リン酸ニカリウム補正液 1mEq/mL | 削除 |
| ステープラ錠 0.1mg        | 削除 |

## 適応追加通知

|   |   |
|---|---|
| フィニバックス点滴用 0.25g  | <b>用法・用量</b><br>通常、成人にはドリベナムとして1回0.25g(力価)を1日2回又は3回、30分以上かけて点滴静注する。なお、年齢・症状に応じて適宜増減するが、 <b>重症・難治性感染症には、1回0.5g(力価)を1日3回投与し、増量が必要と判断される場合に限り1回量として1.0g(力価)、1日量として3.0g(力価)まで投与できる。</b>   |
| デパケンR錠 100mg・200mg<br>デパケン錠 200mg<br>デパケンシロップ 5%<br>セレニカR細粒 40% | <b>片頭痛発作の発症抑制</b><br>(R錠)通常1日量バルプロ酸ナトリウムとして <b>400~800mg</b> を1日1~2回に分けて経口投与する。なお、年齢・症状に応じ適宜増減するが、1日量として1,000mgを超えないこと。<br>(錠)通常1日量バルプロ酸ナトリウムとして <b>400~800mg</b> を1日2~3回に分けて経口投与する。なお、年齢・症状に応じ適宜増減するが、1日量として1,000mgを超えないこと。<br>(シロップ)通常1日量 <b>8~16mL(バルプロ酸ナトリウムとして400~800mg)</b> を1日2~3回に分けて経口投与する。なお、年齢・症状に応じ適宜増減するが、1日量として20mL(バルプロ酸ナトリウムとして1,000mg)を超えないこと。<br>(R細粒)通常、バルプロ酸ナトリウムとして <b>400~800mg</b> を1日1回経口投与する。なお、年齢・症状に応じ適宜増減するが、1日量として1000mgを超えないこと。 |
| ノボセプンHI 静注用 1mg・2mg・5mg   | <b>血小板に対する同種抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在みられるグラッツマン血小板無力症患者の出血傾向の抑制</b><br>本剤は製剤に添付された溶解液を全量用いて溶解し、2~5分かけて静脈内に注射する。 <b>80~120<math>\mu</math>g/kg(4.0~6.0KIU/kg)</b> を止血が得られ、臨床的改善が観察されるまで、1.5~2.5時間ごとに投与する。  |

## 医薬品変更通知

| 今回採用医薬品(採用)                               | 従来採用医薬品(削除)               |
|---|---------------------------|
| ステープラOD錠 0.1mg                            | ステープラ錠 0.1mg              |
| エンシュア・H(バニラ) <b>[震災のため]</b>               | エンシュア・H(黒糖)               |
| ハーセプチン注射用 60mg/150mg(生食なし) <b>[震災のため]</b> | ハーセプチン注射用 60mg/150mg(生食付) |