

新規採用・削除医薬品等通知

薬剤部 医薬品情報管理係

新規採用医薬品通知

(薬品名)	キックリンカプセル 250mg	市販直後調査 平成24年6月～平成24年12月
(英名)	Kiklin Capsules 250mg	
(規格・含有量)	250mg /1カプセル 1カプセル中、有効成分ビキサロマー250mgを含有	
(一般名)	ビキサロマーカプセル	
(メーカー名)	アステラス	
【薬価収載日】	2012年5月	
【薬価】	1錠:29.70円	
【薬効コード】	87219	
【薬効分類名】	高リン血症治療剤	
効能・効果	下記患者における高リン血症の改善 透析中の慢性腎不全患者	
用法・用量	通常、成人には、ビキサロマーとして1回500mgを開始用量とし、1日3回食直前に経口投与する。 以後、症状、血清リン濃度の程度により適宜増減するが、最高用量は1日7,500mgとする。	
禁忌	①本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 ②腸閉塞の患者	
相互作用	他剤副作用増強 甲状腺ホルモン製剤 レボチロキシン等 他剤作用減弱 エナラプリル、アトルバスタチン、バルサルタン、カンデサルタンシレキセチル、テルミサルタン、オルメサルタンメドキシミル、イルベサルタン、シプロフロキサシン	
副作用	重大な副作用 虚血性腸炎、消化管出血、消化管潰瘍、便秘・便秘増悪 その他 硬便、腹部不快感、腹部膨満等	

剤形変更通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
●10月1日より ホスレノール顆粒分包 250mg プロテカジン OD 錠 10 mg 注射用蒸留水「CMX」 500mL マグネビスト静注シリンジ	ホスレノールチュアブル錠 250 mg プロテカジン錠 10 mg 注射用蒸留水(広口開栓) 500mL マグネスコープシリンジ 20mL
●11月5日より グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL「NK」	グラニセトロン静注液 3 mg

削除医薬品通知

●9月30日より

プロテカジン錠 10 mg	削除
注射用蒸留水(広口開栓) 500mL	削除
注射用蒸留水 5mL	削除
生食注 5mL	削除
ホスレノールチュアブル錠 250 mg	削除
ベネシッド錠 250 mg	削除
マグネスコープシリンジ 20mL	削除

●11月4日より

グラニセトロン静注液 3 mg	削除
-----------------	----

適応追加通知

ディオバン 80 mg	<p>高血圧症</p> <p>通常、6歳以上の小児には、バルサルタンとして、体重35kg未満の場合、20mgを、体重35kg以上の場合、40mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。ただし、1日最高用量は、体重35kg未満の場合、40mgとする。</p>
ストラテラ Cap 5 mg 10 mg 25 mg	<p>注意欠陥／多動性障害(AD/HD)</p> <p>18歳以上の患者</p> <p>通常、18歳以上の患者には、アトモキセチンとして1日40mgより開始し、その後1日80mgまで増量した後、1日80～120mgで維持する。</p> <p>ただし、1日80mgまでの増量は1週間以上、その後の増量は2週間以上の間隔をあけて行うこととし、いずれの投与量においても1日1回又は1日2回に分けて経口投与する。</p> <p>なお、症状により適宜増減するが、1日量は120mgを超えないこと。</p>