

# 新規採用・削除医薬品等通知

薬剤部 医薬品情報管理係

## 新規採用医薬品通知

(薬品名)	エムラクリーム	市販直後調査 平成24年4月～平成24年10月
(英名)	EMLA CREAM	
(規格・含有量)	1g中 リドカイン25mg・プロピトカイン25mgを含有	
(一般名)	リドカイン・プロピトカイン配合クリーム	
(メーカー名)	佐藤製薬	
【薬価収載日】	2012年4月	
【薬価】	1g:171.90円	
【薬効コード】	871219	
【薬効分類名】	外用局所麻酔剤	
効能・効果	皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和	
用法・用量	通常、成人には、レーザー照射予定部位に10cm <sup>2</sup> あたり本剤1gを、密封法(ODT)により60分間塗布する。 なお、1回あたりの塗布量は10gまでとし、塗布時間は120分を超えないこと。	
禁忌	①メトヘモグロビン血症のある患者 ②本剤の成分又はアミド型局所麻酔剤に対して過敏症の既往歴のある患者	
相互作用	本剤他剤副作用増強 クラスⅢ抗不整脈剤(アミオダロン等) 本剤他剤副作用増強 サルファ剤(スルファメトキサゾール)、エステル型局所麻酔薬(プロカイン、アミノ安息香酸エチル)、硝酸薬(ニトログリセリン、亜硝酸アミル)、アミド型局所麻酔剤(メピバカイン、プピバカイン)、クラスⅠ抗不整脈薬(リドカイン、キニジン)	
副作用	重大な副作用 ショック、アナフィラキシー様症状、意識障害、振戦、痙攣、メトヘモグロビン血症 その他 紅斑、錯感覚、潮紅、蒼白、ALT(GPT)増加など	

## 削除医薬品通知

●12月3日

パンデル軟膏 1% 10g 削除

ハイセレニン細粒 40% 削除

## 医薬品変更通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
デパケン細粒 40%	ハイセレニン細粒 40%

## 規格追加通知

今回採用医薬品

●12月3日

点滴静注用バンコマイシン 1.0「MEEK」

## 適応追加通知

マキユエイド硝子体内注用 40mg	<p><b>糖尿病黄斑浮腫</b> 通常、本剤1バイアルに1mLの生理食塩液又は眼灌流液を注入してトリアムシロンアセトニド濃度が40mg/mLになるように用時懸濁し、トリアムシロンアセトニドとして4mg(懸濁液として0.1mL)を硝子体内に投与する。</p>
アフィニール錠 2.5mg 5mg	<p>(1)結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫 (2)結節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫</p> <p>(1)通常、成人にはエベロリムスとして1日1回10mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 (2)通常、エベロリムスとして3.0mg/m<sup>2</sup>を1日1回経口投与する。なお、患者の状態やトラフ濃度により適宜増減する。</p>
トラクリア錠 62.5mg	<p><b>肺動脈性肺高血圧症(WHO機能分類クラスⅡ、Ⅲ及びⅣ)</b> 通常、成人には、投与開始から4週間は、ボセンタンとして1回62.5mgを1日2回朝夕食後に経口投与する。投与5週目から、ボセンタンとして1回125mgを1日2回朝夕食後に経口投与する。なお、用量は患者の症状、忍容性などに応じ適宜増減するが、最大1日250mgまでとする。</p>