

新規採用・削除医薬品等通知

薬剤部 医薬品情報管理係

新規採用医薬品通知

(薬品名)	トピロリック錠 40mg
(英名)	TOPILOLIC Tablets 40mg
(規格・含有量)	1錠中、トピロキソスタット 40mg を含有
(一般名)	トピロキソスタット
(メーカー名)	富士薬品
【薬価収載日】	2013 年 8 月
【薬価】	1錠:39.3 円
【薬効コード】	873949
【薬効分類名】	非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤－高尿酸血症治療剤－
効能・効果	痛風、高尿酸血症
用法・用量	通常、成人にはトピロキソスタットとして1回20mgより開始し、1日2回朝夕に経口投与する。その後は血中尿酸値を確認しながら必要に応じて徐々に増量する。維持量は通常1回60mgを1日2回とし、患者の状態に応じて適宜増減するが、最大投与量は1回80mgを1日2回とする。
禁忌	①本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 ②メルカプトプリン水和物又はアザチオプリンを投与中の患者
相互作用	他剤作用増強 ワルファリン、キサンチン系薬剤(テオフィリン等)、ジダノシン 他剤副作用増強 ビダラビン
副作用	重大な副作用 肝機能障害、多形紅斑 その他 痛風関節炎、ALT(GPT)増加、 β -NアセチルDグルコサミニダーゼ増加、 α ミクログロブリン増加、AST(GOT)増加 等

(薬品名)	クレナフィン爪外用液 10%	市販直後調査 平成 26 年 9 月～平成 27 年 3 月
(英名)	CLENAFIN	
(規格・含有量)	1g 中、エフィナコナゾール 100mg を含有	
(一般名)	エフィナコナゾール	
(メーカー名)	科研製薬	
【薬価収載日】	2014 年 9 月	
【薬価】	1657.5 円	
【薬効コード】	87629	
【薬効分類名】	爪白癬治療剤	
効能・効果	<適応菌種> 皮膚糸状菌(トリコフィトン属) <適応症> 爪白癬	
用法・用量	1日1回罹患爪全体に塗布する。	
禁忌	本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者	
副作用	その他 皮膚炎、水疱、紅斑、そう痒、異常感覚 等	

(薬品名)	スタレボ配合錠 L50・100
(英名) (規格・含有量)	Stalevo Combination Tablets L50:1 錠中、レボドパ(日局)50mg、カルビドパ水和物(日局)5.4mg(カルビドパとして 5mg)、エンタカポン 100mg を含有。 L100:1 錠中、レボドパ(日局)100mg、カルビドパ水和物(日局)10.8mg(カルビドパとして 10mg)、エンタカポン 100mg を含有。
(一般名) (メーカー名)	レボドパ／カルビドパ水和物／エンタカポン配合錠 ノバルティス
【薬価収載日】	2014年11月
【薬価】	1 錠:217.3 円(L50)、1 錠:217.3 円(L100)
【薬効コード】	871169
【薬効分類名】	抗パーキンソン剤
効能・効果	パーキンソン病〔レボドパ・カルビドパ投与において症状の日内変動(wearing-off 現象)が認められる場合〕
用法・用量	成人には、レボドパ・カルビドパ・エンタカポンとして1回50mg/5mg/100mg～200mg/20mg/200mgの間で1回1又は2錠を経口投与する。 なお、症状により用量及び投与回数を調節するが、1日総レボドパ量として1,500mg、総カルビドパ量として150mg、総エンタカポン量として1,600mgを超えないこと。また、投与回数は1日8回を超えないこと。
禁忌	①本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 ②悪性症候群、横紋筋融解症又はこれらの既往歴のある患者 ③閉塞隅角緑内障の患者〔眼圧上昇を起し、緑内障が悪化するおそれがある。〕 ④非選択的モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤を投与中の患者
相互作用	本剤作用増強 NMDA 受容体拮抗剤(メマンテン等) 他剤作用増強 COMT により代謝される薬剤(アドレナリン、ノルアドレナリン、イソプレナリン、ドパミン等)、ワルファリン 本剤他剤作用増強 血圧降下剤(メチルドパ、レセルピン、節遮断剤等) 本剤作用減弱 レセルピン製剤、テトラペナジン、抗精神病薬(フェノチアジン系薬剤(クロルプロマジン等)、ブチロフェノン系薬剤(ハロペリドール等)、その他(ペロスピロン等))、パパベリン、イソニアジド 他剤作用減弱 鉄剤 他剤副作用増強 選択的 MAO-B 阻害剤(セレギリン) 本剤他剤副作用増強 他の抗パーキンソン剤(抗コリン剤、アマンタジン、プロモクリプチン)、イストラデフィリン
副作用	重大な副作用 悪性症候群、横紋筋融解症、突発的睡眠、傾眠、幻覚、幻視、幻聴、錯乱、抑うつ、肝機能障害、胃潰瘍・十二指腸潰瘍の悪化、溶血性貧血、血小板減少 その他 ジスキネジー、便秘、着色尿、幻覚、悪心 等

(薬品名)	タブコム配合点眼液 2.5mL	劇
(英名) (規格・含有量)	TAPCOM combination ophthalmic solution 1mL 中、タフルプロスト 15 µg、チモロールマレイン酸塩 6.83mg(チモロールとして 5mg)を含有	
(一般名) (メーカー名)	タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩点眼液 参天製薬	
【薬価収載日】	2014年11月	
【薬価】	1,060円/mL	
【薬効コード】	871319	
【薬効分類名】	緑内障・高眼圧症治療剤	
効能・効果	緑内障、高眼圧症	
用法・用量	1回1滴、1日1回点眼する。	
禁忌	①気管支喘息、又はその既往歴のある患者、気管支痙攣、重篤な慢性閉塞性肺疾患のある患者〔β受容体遮断による気管支平滑筋収縮作用により、喘息発作の誘発・増悪がみられるおそれがある。〕 ②コントロール不十分な心不全、洞性徐脈、房室ブロック(II、III度)、心原性ショックのある患者〔β受容体遮断による陰性変時・変力作用により、これらの症状を増悪させるおそれがある。〕 ③本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者	
相互作用	本剤作用増強 カテコールアミン枯渇剤(レセルピン等)、CYP2D6 阻害作用を有する薬剤(キニジン硫酸塩水和物、選択的セロトニン再取り込み阻害薬) 他剤作用増強 アドレナリン、ジピペフリン塩酸塩 本剤他剤作用増強 β遮断剤(全身投与)(アテノロール、プロプラノロール塩酸塩、メプロロール酒石酸塩)、カルシウム拮抗剤(ベラパミル塩酸塩、ジルチアゼム塩酸塩等)、ジギタリス製剤(ジゴキシン、ジギトキシン)	

副作用	重大な副作用 虹彩色素沈着、眼類天疱瘡、気管支痙攣、呼吸困難、呼吸不全、心ブロック、うっ血性心不全、脳虚血、心停止、脳血管障害、全身性エリテマトーデス その他 睫毛の異常、結膜充血、点状角膜炎などの角膜上皮障害、眼瞼色素沈着、眼刺激 等
-----	---

削除医薬品通知

コレキサミン錠 200 mg	使用量減少の為 3/2 削除
アトラントクリーム 1% 10g	使用量減少の為 3/2 削除
サンピロ点眼液 2% 5mL	使用量減少の為 3/2 削除
レスプレン錠 20 mg	使用量減少の為 3/2 削除
ペルマックス錠 50 µg	使用量減少の為 3/2 削除
ペルマックス錠 250 µg	使用量減少の為 3/2 削除

医薬品規格追加通知

今回採用医薬品
●3月2日より デカドロン錠 4 mg

医薬品変更通知

今回採用医薬品（採用）	従来採用医薬品（削除）
●3月2日より エルカルチン FF 錠 250 mg	エルカルチン錠 300 mg
●3月3日より ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2% 45mL「タイヨー」 ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4 mg/2mL「タイヨー」 リンタシン注射液 600 mg/4mL	ビソルボン吸入液 0.2% 45mL ビソルボン注 4 mg/2mL ダラシン S 注射液 600 mg/4mL

適応追加通知

献血ヴェノグロブリン IH5% 静注 2.5g/50mL 5g/100mL	【効能・効果】 (9) 血清 IgG2 値の低下を伴う、肺炎球菌又はインフルエンザ菌を起炎菌とする急性中耳炎、急性気管支炎又は肺炎の発症抑制(ワクチン接種による予防及び他の適切な治療を行っても十分な効果が得られず、発症を繰り返す場合に限り) 【用法・用量】 人免疫グロブリン G として初回は 300mg(6mL)/kg 体重、2 回目以降は 200mg(4mL)/kg 体重を投与する。投与間隔は、通常、4 週間とする。
イーケプラ錠 500mg イーケプラドライシロップ 50%	【効能・効果】 てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)