

# 新規採用・削除医薬品等通知

## 新規採用医薬品通知

(薬品名)	シェルガン 0.5 眼粘弾剤 0.5mL
(英名)	SHELLGAN 0.5
(規格・含有量)	一筒 0.5mL 中、含量 日局 精製ヒアルロン酸ナトリウム 15mg/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 20mg
(一般名)	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
(メーカー名)	参天製薬株式会社
【薬価収載日】	2016 年 6 月
【薬価】	5658.70 円
【薬効コード】	871319
【薬効分類名】	眼科手術補助剤
効能・効果	次の一連の眼科手術における手術補助:超音波乳化吸引法による白内障摘出術及び眼内レンズ挿入術
用法・用量	通常、超音波乳化吸引法による白内障摘出時には0.1~0.4mL、眼内レンズ挿入時には0.1~0.3mLを前房内へ注入する。又、必要に応じて眼内レンズのコーティングに0.1mL使用する。
禁忌	記載なし
相互作用	記載なし
副作用	<b>重大な副作用:</b> 記載なし <b>その他:</b> 5%以上の記載なし

(薬品名)	ビラノア錠 20mg	市販直後調査 2016 年 11 月~2017 年 5 月
(英名)	Bilanoa tablet 20mg	
(規格・含有量)	1 錠中 ビラスチンとして 20mg	
(一般名)	ビラスチン	
(メーカー名)	大鵬薬品工業株式会社	
【薬価収載日】	2016 年 11 月	
【薬価】	79.70 円	
【薬効コード】	874490	
【薬効分類名】	アレルギー性疾患治療剤	
効能・効果	アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒	
用法・用量	通常、成人にはビラスチンとして1回20mgを1日1回空腹時に経口投与する。	
禁忌	本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者	
相互作用	記載なし	
副作用	<b>重大な副作用:</b> 記載なし <b>その他:</b> 5%以上の記載なし	

(薬品名)	マーデュオックス軟膏 10g	劇
(英名)	Marduox Ointment	
(規格・含有量)	1g 中、マキサカルシトール 25 µg/ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 0.5mg	
(一般名)	マキサカルシトール/ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	
(メーカー名)	マルホ株式会社	
【薬価収載日】	2016年5月	
【薬価】	1g:231.00円	
【薬効コード】	872699	
【薬効分類名】	尋常性乾癬治療剤	
効能・効果	尋常性乾癬	
用法・用量	通常、1日1回、適量を患部に塗布する。	
禁忌	1. 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者 2. 細菌・真菌・スピロヘータ・ウイルス皮膚感染症及び動物性皮膚疾患(疥癬、けじらみ等)[感染症及び動物性皮膚疾患症状を悪化させることがある。] 3. 潰瘍(ペーチェット病は除く)、第2度深在性以上の熱傷・凍傷[皮膚の再生が抑制され、治癒が著しく遅れるおそれがある。また、感染のおそれがある。]	
相互作用	その他 ビタミンD及びその誘導体、PTH製剤、カルシウム製剤	
副作用	重大な副作用:高カルシウム血症、急性腎不全 その他:5%以上の記載なし	

(薬品名)	リクラスト点滴静注液 5mg	劇	市販直後調査 2016年11月~2017年5月
(英名)	Reclast for I.v. Infusion		
(規格・含有量)	1ボトル 100mL 中、ゾレドロン酸水和物 5.33mg(ゾレドロン酸として 5.0mg)		
(一般名)	ゾレドロン酸水和物		
(メーカー名)	旭化成ファーマ株式会社		
【薬価収載日】	2016年11月		
【薬価】	39,485円		
【薬効コード】	873999		
【薬効分類名】	骨粗鬆症治療剤		
効能・効果	骨粗鬆症		
用法・用量	通常、成人には1年に1回ゾレドロン酸として5mgを15分以上かけて点滴静脈内投与する。		
禁忌	1.本剤の成分又は他のビスホスホネート製剤に対し、過敏症の既往歴のある患者 2.重度の腎障害(クレアチニンクリアランス 35mL/min 未満)のある患者[急性腎不全を起こすことがある] 3.脱水状態(高熱、高度な下痢及び嘔吐等)にある患者[急性腎不全を起こすことがある] 4.低カルシウム血症の患者 5.妊婦又は妊娠している可能性のある婦人		
相互作用	本剤他剤作用増強 カルシトニン製剤(エルカトニン、サケカルシトニン)、アミノグリコシド系抗生物質(ゲンタマイシン等)、シナカルセト その他 利尿剤(フロセミド、ヒドロクロロチアジド等)、腎毒性を有する薬剤(非ステロイド系消炎鎮痛剤(インドメタシン等)等)		
副作用	重大な副作用:急性腎不全、間質性腎炎、ファンコニー症候群、低カルシウム血症、顎骨壊死・顎骨髄炎、外耳道骨壊死、大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折、アナフィラキシー その他:頭痛、関節痛、筋肉痛、発熱、倦怠感、インフルエンザ様疾患		

(薬品名)	<b>デザレックス錠 5mg</b>	市販直後調査 2016年11月~2017年5月
(英名)	DESALEX Tablets 5mg	
(規格・含有量)	1錠中、デスロラタジンとして5mg	
(一般名)	デスロラタジン	
(メーカー名)	杏林製薬株式会社	
【薬価収載日】	2016年11月	
【薬価】	69.40円	
【薬効コード】	87449	
【薬効分類名】	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤	
効能・効果	アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒	
用法・用量	通常、12歳以上の小児及び成人にはデスロラタジンとして1回5mgを1日1回経口投与する。	
禁忌	本剤の成分又はロラタジンに対し過敏症の既往歴のある患者	
相互作用	<b>本剤作用増強</b> エリスロマイシン	
副作用	<b>重大な副作用:</b> ショック、アナフィラキシー、てんかん、痙攣、肝機能障害、黄疸 <b>その他:</b> 5%以上の記載なし	

## 医薬品変更通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
● <u>2月1日より</u> セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」 250mL	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 250mL

## 削除医薬品通知

● <u>2月1日より</u>		
アスタットクリーム 1%10g	2/1	削除
エコリシン点眼液 5mL	2/1	削除
黄色ワセリン 500g	2/1	削除
セルテクト錠 30mg	2/1	削除
エルシトニン注 20S ディスポ 1mL	2/1	削除
硫酸セフピロム静注用 1g「マイラン」	2/1	削除

## 医薬品規格変更通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
● <u>2月1日より</u> イソバイドシロップ 70% 分包 20mL、30mL スピオルトレスピマット 60 吸入	イソバイドシロップ 70% 500mL スピオルトレスピマット 28 吸入

## 医薬品剤形変更通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
● <u>2月1日より</u> グルファスト OD 錠 10mg	グルファスト錠 10mg

## 医薬品名称変更通知

新製品名	旧製品名
● <u>2月15日より</u> ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「F」10g	エルタシン軟膏 0.1% 10g

## 後発医薬品採用通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
● <u>2月15日より</u> オクトレオチド酢酸塩皮下注 100 µg/1mL「サンド」	サンドスタチン皮下注用 100 µg/mL

