

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	ゼンタコートカプセル 3mg	市販直後調査 2016 年 11 月～2017 年 5 月
(英名)	Zentacort capsules	
(規格・含有量)	1 カプセル中、ブデソニドとして 3mg	
(一般名)	ブデソニド	
(メーカー名)	ゼリア新薬工業株式会社	
【薬価収載日】	2016 年 11 月	
【薬価】	256.9 円	
【薬効コード】	87239	
【薬効分類名】	クローン病治療剤	
効能・効果	軽症から中等症の活動期クローン病	
用法・用量	通常、成人にはブデソニドとして9mgを1日1回朝経口投与する。	
禁忌	1.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2.有効な抗菌剤の存在しない感染症、深在性真菌症の患者[症状が増悪するおそれがある。]	
相互作用	本剤作用増強 CYP3A4 阻害剤、イトラコナゾール等、グレープフルーツ、グレープフルーツジュース	
副作用	重大な副作用:記載なし その他:5%以上の記載なし	

削除医薬品通知

●3月1日より

ビジクリア配合錠

3/1 削除

医薬品剤形変更通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
●3月1日より アセリオ静注液 1000mg/100mL バッグ	アセリオ静注液 1000mg/100mL

後発医薬品採用通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
<p>●3月1日より</p> <p>テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「サワイ」10g</p>	<p>ラミシールクリーム 1% 10g</p>

適応追加通知

献血ヴェノグロブリン IH5%静注 0.5g/10mL
 献血ヴェノグロブリン IH5%静注 2.5g/50mL
 献血ヴェノグロブリン IH5%静注 5g/100mL
 献血ヴェノグロブリン IH5%静注 10g/200mL

【効能・効果】

● 500mg製剤(10mL), 1,000mg製剤(20mL), 2,500mg製剤(50mL), 5,000mg製剤(100mL)

1~10. 略

11. **ギラン・バレー症候群(急性増悪期で歩行困難な重症例)**

●10,000mg製剤(200mL)

1~9. 略

10. **ギラン・バレー症候群(急性増悪期で歩行困難な重症例)**

【用法・用量】

本剤は効能・効果に応じて以下のとおり投与する。なお、直接静注する場合は、きわめて緩徐に行うこと。

- ・低並びに無ガンマグロブリン血症: 略
- ・重症感染症における抗生物質との併用: 略
- ・特発性血小板減少性紫斑病: 略
- ・川崎病の急性期: 略
- ・多発性筋炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善(ステロイド剤が効果不十分な場合に限り): 略
- ・慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多巣性運動ニューロパチーを含む)の筋力低下の改善: 略
- ・全身型重症筋無力症(ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限り): 略
- ・天疱瘡(ステロイド剤の効果不十分な場合): 略
- ・血清IgG2値の低下を伴う、肺炎球菌又はインフルエンザ菌を起炎菌とする急性中耳炎、急性気管支炎又は肺炎の発症抑制(ワクチン接種による予防及び他の適切な治療を行っても十分な効果が得られず、発症を繰り返す場合に限り): 略
- ・水疱性類天疱瘡(ステロイド剤の効果不十分な場合): 略
- ・**ギラン・バレー症候群(急性増悪期で歩行困難な重症例): 通常、1日に人免疫グロブリンGとして400mg(8mL)/kg体重を5日間連日点滴静注する。**

