

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	シーブリ吸入用カプセル 50 μ g
(英名)	Seebri inhalation capsules 50 μ g
(規格・含有量)	1 カプセル中グリコピロニウム臭化物 63 μ g(グリコピロニウムとして 50 μ g)
(一般名)	グリコピロニウム
(メーカー名)	Meiji Seika ファルマ株式会社
【薬価収載日】	2012 年 11 月
【薬価】	204.70 円
【薬効コード】	872259
【薬効分類名】	長時間作用性吸入気管支拡張剤
効能・効果	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解
用法・用量	通常、成人には1回1カプセル(グリコピロニウムとして50 μ g)を1日1回本剤専用の吸入用器具を用いて吸入する。
禁忌	1 . 閉塞隅角緑内障の患者〔抗コリン作用により、眼圧が上昇し症状を悪化させるおそれがある。〕 2 . 前立腺肥大等による排尿障害がある患者〔抗コリン作用により、尿閉を誘発するおそれがある。〕 3 . 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
相互作用	記載なし
副作用	重大な副作用 心房細動 その他 5%以上の記載なし

(薬品名)	アメナリーフ錠 200mg	市販直後調査:平成 29 年 9 月~平成 30 年 3 月
(英名)	Amenalief	
(規格・含有量)	1 錠中、アメナメビルとして 200mg	
(一般名)	アメナメビル	
(メーカー名)	マルホ株式会社	
【薬価収載日】	2017 年 8 月	
【薬価】	1469.70 円	
【薬効コード】	87625	
【薬効分類名】	抗ヘルペスウイルス剤	
効能・効果	带状疱疹	
用法・用量	通常、成人にはアメナメビルとして1回400mgを1日1回食後に経口投与する。	
禁忌	(1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 (2) リファンピシンを投与中の患者	
相互作用	本剤他剤作用減弱 リファンピシン、CYP3A を誘導する薬剤(リファブチン、カルバマゼピン、フェノバルビタール等)、セイヨウオトギリソウ(St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート)含有食品 他剤作用減弱 CYP3A の基質となる薬剤(ミダゾラム、プロチゾラム、ニフェジピン等)、CYP2B6 の基質となる薬剤(エファビレンツ) 本剤作用増強 CYP3A を阻害する薬剤(リトナビル、クラリスロマイシン等)、グレープフルーツジュース 本剤作用減弱 シクロスポリン	
副作用	重大な副作用 記載なし その他 5%以上の記載なし	

備考

皮膚科限定薬

後発医薬品採用通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
● <u>12月1日より</u> カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠 30mg「日医工」 ケーサプライ錠 600mg(K:8mEq) ATP 腸溶錠 20mg「日医工」	アドナ錠 30mg スローケー錠 600mg(K:8mEq) アデホスコーフ腸溶錠 20mg

削除医薬品通知

●12月1日より

ザルックス軟膏 0.12% 5g 削除

オーキシス 9µg タービュヘイラー 60 吸入 削除

医薬品規格追加通知

●12月4日より

アロプリノール錠 50mg「タナベ」 12/4 採用

アマリール錠 0.5mg 12/4 採用

ダイアート錠 30mg 12/4 採用

タナトリル錠 2.5mg 12/4 採用

トリクロルメチアジド錠 1mg「NP」 12/4 採用

ニューロタン錠 25mg 12/4 採用

フェブリック錠 10mg 12/4 採用

フロセミド錠 10mg「武田テバ」 12/4 採用

ミカルデイス錠 20mg 12/4 採用

レニベース錠 2.5mg 12/4 採用

医薬品変更通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
● <u>12月1日より</u> ソセゴン注射液 15mg/1mL	ペンタジン注射液 15mg/1mL