

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	ビジパーク 270 注 50mL ビジパーク 270 注 100mL
(英名)	VISIPAQUE INJECTION
(規格・含有量)	50mL イोजキサノール 27.49g[ヨード含有量:13.5g(270mg/mL)] 100mL イोजキサノール 54.97g[ヨード含有量:27g(270mg/mL)]
(一般名)	イोजキサノール
(メーカー名)	第一三共株式会社
【薬価収載日】	2008 年 6 月
【薬価】	ビジパーク 270 注 50mL 4,632 円 ビジパーク 270 注 100mL 8,814 円
【薬効コード】	877219
【薬効分類名】	非イオン性等浸透圧造影剤
効能・効果	脳血管撮影、四肢血管撮影、逆行性尿路撮影、内視鏡的逆行性膵胆管撮影
用法・用量	通常、成人1回、下記の量を使用する。なお、非血管内への注入に際しては、年齢、体重、症状、目的により適宜増減する。また、血管内に投与する場合の総投与量は、270mgI/mL製剤は180mL、320mgI/mL製剤は150mLまでとする。 〔() 内はヨード含有量を示す〕 ・脳血管撮影 4～15mL(1.08～4.05g) ・四肢血管撮影 8～80mL(2.16～21.6g) ・逆行性尿路撮影 20～200mL(5.4～54g) *原液を生理食塩水で2倍希釈し用いることも可能とする ・内視鏡的逆行性膵胆管撮影 3～40mL(0.81～10.8g)
禁忌	1.ヨード又はヨード造影剤に過敏症の既往歴のある患者 2.重篤な甲状腺疾患のある患者[ヨードが甲状腺に集積し、症状が悪化するおそれがある。]
相互作用	他剤作用増強 ビグアナイド系糖尿病用薬(メトホルミン塩酸塩、プロホルミン塩酸塩等)
副作用	重大な副作用 ショック、アナフィラキシー様症状、肺水腫、心室細動、痙攣発作、腎不全 その他 5%以上の記載なし

後発医薬品採用通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
●1月4日より シルニジピン錠 10mg「タイヨー」 シメチジン錠 200mg「日医工」 ジラゼブ塩酸塩錠 50mg「日医工」	アテレック錠 10 タガメット錠 200mg コメリアンコーワ錠 50

削除医薬品通知

●1月4日より

オムニパーク 300 注 50mL

削除

オムニパーク 300 注 100mL

削除

医薬品変更通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
●1月4日より リクシアナ OD 錠 30mg リクシアナ OD 錠 60mg	リクシアナ錠 30mg リクシアナ錠 60mg

適応追加通知

キイトルーダ点滴静注 20mg

キイトルーダ点滴静注 100mg

【効能・効果】

根治切除不能な悪性黒色腫

PD-L1 陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫

がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌

【用法・用量】

＜根治切除不能な悪性黒色腫＞(略)

＜PD-L1 陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫、がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌＞

通常、成人には、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)として、1回200mgを3週間間隔で30分間かけて点滴静注する。

ジプレキサザイデイス錠 2.5mg

ジプレキサザイデイス錠 10mg

【効能・効果】

統合失調症

双極性障害における躁症状及びうつ症状の改善

抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)

【用法・用量】

統合失調症:(略)

双極性障害における躁症状の改善:(略)

双極性障害におけるうつ症状の改善:(略)

抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐):他の制吐剤との併用において、通常、成人にはオランザピンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜増量するが、1日量は10mgを超えないこと。