

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	カナリア配合錠
(英名)	CANALIA COMBINATION TABLETS
(規格・含有量)	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物 31mg(テネリグリブチンとして 20mg) / カナグリフロジン水和物 102mg (カナグリフロジンとして 100mg)
(一般名)	テネリグリブチン/カナグリフロジン
(メーカー名)	第一三共株式会社
【薬価収載日】	2017 年 8 月
【薬価】	300.30 円
【薬効コード】	873969
【薬効分類名】	選択的 DPP-4 阻害剤/SGLT2 阻害剤 配合剤-2 型糖尿病治療剤-
効能・効果	2 型糖尿病 ただし、テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物及びカナグリフロジン水和物の併用による治療が適切と判断される場合に限る
用法・用量	通常、成人には1日1回1錠(テネリグリブチン/カナグリフロジンとして20mg/100mg)を朝食前又は朝食後に経口投与する。
禁忌	(1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 (2) 重症ケトosis, 糖尿病性昏睡又は前昏睡, 1 型糖尿病の患者〔輸液及びインスリンによる速やかな高血糖の是正が必須となるので本剤の投与は適さない。〕 (3) 重症感染症, 手術前後, 重篤な外傷のある患者〔インスリン注射による血糖管理が望まれるので本剤の投与は適さない。〕
相互作用	本剤他剤作用増強 糖尿病用薬(スルホニルウレア剤、速効型インスリン分泌促進薬、 α -グルコシダーゼ阻害薬、ビグアナイド系薬剤、チアゾリジン系薬剤、GLP-1 受容体作動薬、インスリン製剤等) 本剤作用増強 血糖降下作用を増強する薬剤(β -遮断剤、サリチル酸剤モノアミン酸化酵素阻害剤等) 本剤作用減弱 血糖降下作用を減弱する薬剤(アドレナリン副腎皮質ホルモン、甲状腺ホルモン等)、リファンピシン、フェニトイン、フェノバルビタール、リトナビル等 他剤作用増強 ジゴキシン、利尿作用を有する薬剤(ループ利尿薬、サイアザイド系利尿薬等) その他 QT 延長を起こすことが知られている薬剤: クラス IA 抗不整脈薬(キニジン硫酸塩水和物、プロカインアミド塩酸塩等)、クラス III 抗不整脈薬(アミオダロン塩酸塩、ソタロール塩酸塩等)
副作用	重大な副作用 低血糖、脱水、ケトアシドーシス、腎盂腎炎、敗血症、腸閉塞、肝機能障害、間質性肺炎、類天疱瘡 その他 5%以上の記載なし

(薬品名)	レパーサ皮下注 420mg/3.5mL オートミニ ドーザー	生 物
(英名)	Repatha	
(規格・含有量)	エボロクマブ(遺伝子組み換え)420mg	
(一般名)	エボロクマブ	
(メーカー名)	アステラス製薬株式会社	
【薬価収載日】	2017年11月	
【薬価】	46,511円	
【薬効コード】	872189	
【薬効分類名】	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤	
効能・効果	家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症 ただし、心血管イベントの発現リスクが高く、HMGCoA還元酵素阻害剤で効果不十分な場合に限る。	
用法・用量	家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体及び高コレステロール血症:通常、成人にはエボロクマブ(遺伝子組換え)として420mgを4週間に1回皮下投与する。 家族性高コレステロール血症ホモ接合体:通常、成人にはエボロクマブ(遺伝子組換え)として420mgを4週間に1回皮下投与する。効果不十分な場合には420mgを2週間に1回皮下投与できる。なお、LDLアフェレーシスの補助として本剤を使用する場合は、開始用量として420mgを2週間に1回皮下投与することができる。	
禁忌	本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者	
相互作用	記載なし	
副作用	重大な副作用 記載なし その他 5%以上の記載なし	

後発医薬品採用通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
<p>●<u>4月2日より</u></p> <p>アズレン・グルタミン配合顆粒「EMEC」0.67g ヒート</p> <p>トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーフ」</p>	<p>マーズレン S 配合顆粒 0.67g ヒート</p> <p>ユベランカプセル 100mg</p>

削除医薬品通知

● <u>4月1日より</u>	
アブネカット経口液 10mg	3/31 削除
クレスチン細粒 1g ヒート	3/31 削除
ボセルモンデポー筋注 1mL	3/31 削除
● <u>4月2日より</u>	
パラアミノ馬尿酸ソーダ注 2g/20mL	4/1 削除
ペルジピン LA カプセル 40mg	4/1 削除

医薬品剤形変更通知

今回採用医薬品（採用）	従来採用医薬品（削除）
●4月2日より アミノレバン EN 配合散 50g(フルーツ味)	アミノレバン EN 配合散 50g

適応追加通知

レンピマカプセル 4mg	【効能・効果】 切除不能な肝細胞癌 【用法・用量】 通常、成人には体重にあわせてレンパチニブとして体重60kg以上の場合は12mg、体重60kg未満の場合は8mgを1日1回、経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。
--------------	---