

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	ナルサス錠 2mg/6mg	劇 麻
(英名)	NARUSUS Tablets	
(規格・含有量)	1錠中、ヒドロモルフォンとして 2 mg/6mg	
(一般名)	ヒドロモルフォン	
(メーカー名)	第一三共株式会社	
【薬価収載日】	2017 年 5 月	
【薬価】	2mg:202.80 円/6mg:530.20 円	
【薬効コード】	878119	
【薬効分類名】	持続性癌疼痛治療剤	
効能・効果	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	
用法・用量	通常、成人にはヒドロモルフォンとして4～24mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じて適宜増減する。	
禁忌	1.重篤な呼吸抑制のある患者[呼吸抑制を増強する。] 2.気管支喘息発作中の患者[気道分泌を妨げる。] 3.慢性肺疾患に続発する心不全の患者[呼吸抑制や循環不全を増強する。] 4.痙攣状態(てんかん重積症、破傷風、ストリキニーネ中毒)にある患者[脊髄の刺激効果があらわれる。] 5.麻痺性イレウスの患者[消化管運動を抑制する。] 6.急性アルコール中毒の患者[呼吸抑制を増強する。] 7.本剤の成分及びアヘンアルカロイドに対し過敏症の患者 8.出血性大腸炎の患者[腸管出血性大腸菌(O157等)や赤痢菌等の重篤な細菌性下痢のある患者では、症状の悪化、治療期間の延長をきたすおそれがある。]	
相互作用	他剤作用増強 中枢神経抑制剤(フェノチアジン誘導体、バルビツール酸誘導体等、吸入麻酔剤、MAO阻害剤、三環系抗うつ剤、β遮断剤、アルコール、クマリン系抗凝血剤(ワルファリン)、抗コリン作用を有する薬剤) 本剤作用減弱 ブプレノルフィン、ペンタゾシン等	
副作用	重大な副作用 依存性、呼吸抑制、意識障害、イレウス(麻痺性イレウスを含む)、中毒性巨大結腸 その他 傾眠、悪心、嘔吐、便秘	

(薬品名) リグロス歯科用液キット 600 µg	
(英名)	REGROTH
(規格・含有量)	1 キット中にトラフェルミン(遺伝子組換え)0.81mg(97.2 万国標準単位)注 1 を含有する。
(一般名)	トラフェルミン
(メーカー名)	科研製薬株式会社
【薬価収載日】	2016 年 11 月
【薬価】	20670.90 円
【薬効コード】	87279
【薬効分類名】	歯周組織再生剤
効能・効果	歯周炎による歯槽骨の欠損
用法・用量	歯肉剥離搔爬手術時に歯槽骨欠損部を満たす量を塗布する。
禁忌	1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 2. 口腔内に悪性腫瘍のある患者又はその既往歴のある患者[本剤が細胞増殖促進作用を有するため]
相互作用	記載なし
副作用	重大な副作用 記載なし その他 5%以上の記載なし

(薬品名) フィルグラスチム BS 注 300 µg シリンジ「モチダ」	
(英名)	Filgrastim BS 300 µg Syringe for Inj. MOCHIDA
(規格・含有量)	1 シリンジ(0.7mL)中フィルグラスチム(遺伝子組換え)300 µg
(一般名)	フィルグラスチム
(メーカー名)	持田製薬株式会社
【薬価収載日】	2013 年 5 月
【薬価】	10163 円
【薬効コード】	873399
【薬効分類名】	G-CSF製剤
効能・効果	1. 造血幹細胞の末梢血中への動員 2. 造血幹細胞移植時の好中球数の増加促進 3. がん化学療法による好中球減少症 4. ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症の治療に支障を来す好中球減少症 5. 骨髄異形成症候群に伴う好中球減少症 6. 再生不良性貧血に伴う好中球減少症 7. 先天性・特発性好中球減少症
用法・用量	(略)
禁忌	1. 本剤の成分又は他の顆粒球コロニー形成刺激因子製剤に過敏症の患者 2. 骨髄中の芽球が十分減少していない骨髄性白血病の患者及び末梢血液中に骨髄芽球の認められる骨髄性白血病の患者[芽球が増加することがある。]
相互作用	記載なし
副作用	重大な副作用 ショック、アナフィラキシー、間質性肺炎、急性呼吸窮迫症候群、芽球の増加、脾破裂、毛細血管漏出症候群 その他 腰痛・背部痛、骨痛、関節痛、ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇
備考	グランM300シリンジのバイオシミラー医薬品

後発医薬品採用通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
● <u>5月1日より</u> ティアバランス点眼液0.1% トーワチーム配合顆粒 リボフラビン酪酸エステル錠 20mg「杏林」 アルプラゾラム錠 0.4mg「サワイ」 スルピリド錠 50mg(TYK) ニトラゼパム錠 5mg「トローワ」	ヒアレイン点眼液 0.1% PL 配合顆粒 ハイボン錠 20mg ソラナックス錠 0.4mg ドグマチール錠 50mg ベンザリン錠 5mg

削除医薬品通知

● <u>5月1日より</u>	
アンペック坐剤 20mg	4/30 削除
モルヒネ塩酸塩錠 10mg	4/30 削除
歯科用フェノール・カンフル	4/30 削除
グラン M300 シリンジ	4/30 削除

適応追加通知

メロペネム点滴静注用 0.5g「明治」	【効能・効果】 化膿性髄膜炎 【用法・用量】 通常、成人にはメロペネムとして、1日6g(力価)を3回に分割し、30分以上かけて点滴静注する。なお、年齢・症状に応じて適宜減量する。 通常、小児にはメロペネムとして、1日120mg(力価)/kgを3回に分割し、30分以上かけて点滴静注する。なお、年齢・症状に応じて適宜減量する。ただし、成人における1日用量6g(力価)を超えないこととする。
---------------------	---