

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	ゾフルーザ錠 10mg/20mg	市販直後調査:平成 30 年 3 月~平成 30 年 9 月
(英名)	XOFLUZA	
(規格・含有量)	1 錠中、バロキサビルマルボキシルとして 10 mg/20mg	
(一般名)	バロキサビル	
(メーカー名)	塩野義製薬株式会社	
【薬価収載日】	2018 年 3 月	
【薬価】	10mg:1507.50 円/20mg:2394.50 円	
【薬効コード】	87625	
【薬効分類名】	抗インフルエンザウイルス剤	
効能・効果	A 型又は B 型インフルエンザウイルス感染症	
用法・用量	1.通常, 成人及び12歳以上の小児には, 20mg 錠2錠(バロキサビルマルボキシルとして40mg)を単回経口投与する。ただし, 体重80kg以上の患者には20mg 錠4錠(バロキサビルマルボキシルとして80mg)を単回経口投与する。 2.通常, 12歳未満の小児には, 以下の用量を単回経口投与する。	
	体重	用量
	40kg 以上	20mg 錠 2 錠 (バロキサビルマルボキシルとして 40mg)
	20kg 以上 40kg 未満	20mg 錠 1 錠 (バロキサビルマルボキシルとして 20mg)
	10kg 以上 20kg 未満	10mg 錠 1 錠 (バロキサビルマルボキシルとして 10mg)
禁忌	本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者	
相互作用	記載なし	
副作用	重大な副作用 記載なし その他 5%以上の記載なし	

(薬品名)	リオナ錠 250mg
(英名)	Riona tab
(規格・含有量)	1錠中、クエン酸第二鉄水和物を無水物として(クエン酸第二鉄として)250mg含有
(一般名)	クエン酸第二鉄水和物
(メーカー名)	鳥居薬品株式会社
【薬価収載日】	2014年4月
【薬価】	81.20円
【薬効コード】	87219
【薬効分類名】	高リン血症治療剤
効能・効果	慢性腎臓病患者における高リン血症の改善
用法・用量	通常、成人には、クエン酸第二鉄として1回500mgを開始用量とし、1日3回食直後に経口投与する。以後、症状、血清リン濃度の程度により適宜増減するが、最高用量は1日6,000mgとする。
禁忌	本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
相互作用	他剤作用減弱 甲状腺ホルモン剤(レボチロキシン等)、キノロン系抗菌剤(シプロフロキサシン等)、テトラサイクリン系抗生物質(テトラサイクリン等)、セフジニル、抗パーキンソン剤(ベンセラジド・レボドパ等)、エルトロンボパグ オラミン 他剤作用増強 経口アルミニウム製剤(水酸化アルミニウムゲル、合成ケイ酸アルミニウム)
副作用	重大な副作用 記載なし その他 5%以上の記載なし

(薬品名)	レキシサルティ錠 1mg/2mg	劇	市販直後調査:平成30年4月~平成30年10月
(英名)	LEXULTI tablets		
(規格・含有量)	1錠中、プレクスピプラゾール 1mg/2mg		
(一般名)	プレクスピプラゾール		
(メーカー名)	大塚製薬株式会社		
【薬価収載日】	2018年4月		
【薬価】	1mg:268.9円/2mg:509.20円		
【薬効コード】	871179		
【薬効分類名】	抗精神病薬		
効能・効果	統合失調症		
用法・用量	通常、成人にはプレクスピプラゾールとして1日1回1mgから投与を開始した後、4日以上の間隔をあけて増量し、1日1回2mgを経口投与する。		
禁忌	1. 昏睡状態の患者[昏睡状態を悪化させるおそれがある。] 2. バルビツール酸誘導体・麻酔剤等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者[中枢神経抑制作用が増強されるおそれがある。] 3. アドレナリンを投与中の患者(アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く) 4. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者		
相互作用	本剤他剤作用増強 中枢神経抑制剤(バルビツール酸誘導体、麻酔剤等)		
副作用	重大な副作用 悪性症候群、遅発性ジスキネジア、麻痺性イレウス、横紋筋融解症、高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡、痙攣、無顆粒球症、白血球減少、肺塞栓症、深部静脈血栓症 その他 アカシジア		

後発医薬品採用通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
<p>●<u>6月1日より</u></p> <p>トフィソパム錠 50mg「日医工」</p> <p>ジクロフェナク Na 錠 25mg「サワイ」</p> <p>アマンタジン塩酸塩錠 50mg「杏林」</p> <p>アマンタジン塩酸塩細粒 10%「サワイ」</p> <p>ジアパックス錠 2mg/5mg</p>	<p>グラндаキシシ錠 50</p> <p>ボルタレン錠 25mg</p> <p>シンメトレル錠 50mg</p> <p>シンメトレル細粒</p> <p>セルシン錠 2mg/5mg</p>

医薬品名称変更通知

変更後	変更前
<p>●<u>6月1日より</u></p> <p>アルプロスタジル注 10μg シリンジ「科研」</p>	<p>プリンク注シリンジ 10μg</p> <p>*プリンク注シリンジは 6/1 以降もオーダ可能</p>

削除医薬品通知

● <u>6月1日より</u>	
ミケラン錠 5mg	5/31 削除
ウルグートカプセル 200mg	5/31 削除
カルバン錠 50mg	5/31 削除
メロベン点滴用パイア 0.5g	5/31 削除
エビリファイ内用液 0.1% 3mL	5/31 削除

