

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	エイベリス点眼液 0.002%	劇	市販直後調査:2018年11月~2019年5月
(英名)	Omidenepag Isopropyl		
(規格・含有量)	オミデネパグ イソプロピルを1mL中20 μ g含有		
(一般名)	オミデネパグ イソプロピル		
(メーカー名)	参天製薬株式会社		
【薬価収載日】	2018/11/20		
【薬価】	945.30円(1本(2.5mL)あたり)		
【薬効コード】	871319		
【薬効分類名】	緑内障・高眼圧症治療剤		
効能・効果	緑内障、高眼圧症		
用法・用量	1回1滴、1日1回点眼する。		
禁忌	(1)無水晶体眼又は眼内レンズ挿入眼の患者〔嚢胞様黄斑浮腫を含む黄斑浮腫、及びそれに伴う視力低下及び視力障害を起こすおそれがある〕 (2)タフルプロスト(タプロス点眼液、タプロコム配合点眼液)を投与中の患者 (3)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者		
相互作用	チモロールマレイン酸塩との併用例で結膜充血等の眼炎症性副作用の発現頻度の上昇が認められた。。		
副作用	重大な副作用 5.2% 嚢胞様黄斑浮腫を含む黄斑浮腫 その他 10%以上 結膜充血 5%以上 角膜肥厚		

削除医薬品通知

リボスチン点眼液 0.025%	5/15 削除
ロキソニン錠 60mg	5/1 削除

適応追加通知

<p>オノアクト点滴静注用 50mg</p>	<p>【効能・効果】</p> <p>1. 手術時の下記の頻脈性不整脈に対する緊急処置： 心房細動、心房粗動、洞性頻脈</p> <p>2. 手術後の循環動態監視下における下記の頻脈性不整脈に対する緊急処置： 心房細動、心房粗動、洞性頻脈</p> <p>3. 心機能低下例における下記の頻脈性不整脈： 心房細動、心房粗動</p> <p>4. **生命に危険のある下記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合： 心室細動、血行動態不安定な心室頻拍</p> <p>【用法・用量】</p> <p>1～3、省略</p> <p>4. **生命に危険のある下記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合： 心室細動、血行動態不安定な心室頻拍 ランジオロール塩酸塩として、1 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ の速度で静脈内持続投与を開始する。投与中は心拍数、血圧を測定し 1～10 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ の用量で適宜調節する。なお、心室細動又は血行動態不安定な心室頻拍が再発し本剤投与が必要な場合には、心拍数、血圧を測定し最大 40 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ まで増量できる。</p>
<p>フォシーガ錠 5mg</p>	<p>【効能・効果】</p> <p>2 型糖尿病</p> <p>1 型糖尿病</p> <p>【用法・用量】</p> <p>2 型糖尿病(省略)</p> <p>インスリン製剤との併用において、通常、成人にはダパグリフロジンとして 5mg を 1 日 1 回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら 10mg 1 日 1 回に増量することができる</p>
<p>点滴静注用ホスカビル注 24mg/mL</p>	<p>【効能・効果】</p> <p>1.2 省略</p> <p>3.造血幹細胞移植後のヒトヘルペスウイルス 6 脳炎○高ビリルビン血症(閉塞性黄疸を除く)における肝機能の改善</p> <p>【用法・用量】</p> <p>1.2 省略</p> <p>○造血幹細胞移植後のヒトヘルペスウイルス 6 脳炎 通常、ホスカルネットナトリウム水和物として 1 回体重 1kg あたり 60mg を、1 時間以上かけて 8 時間ごとに 1 日 3 回点滴静注する。なお、本剤による腎障害を軽減するため、本剤による治療中には水分補給を十分に行い、利尿を確保すること。</p>