

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	ビバンセカプセル 20mg・30mg	劇 市販直後調査:2019年12月~2020年6月
(英名)	Lisdexamfetamine Mesilate	
(規格・含有量)	1カプセル中 リスデキサンフェタミンメシル酸塩 20mg・30mg	
(一般名)	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	
(メーカー名)	シオノギ製薬	
【薬価収載日】	2019年5月	
【薬価】	20mg; 663.7円 ・30mg; 735.4円	
【薬効コード】	1179	
【薬効分類名】	中枢神経刺激剤	
効能・効果	小児期における注意欠陥/多動性障害(AD/HD)	
用法・用量	通常、小児にはリスデキサンフェタミンメシル酸塩として30mgを1日1回朝経口投与する。症状により、1日70mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として20mgを超えない範囲で行うこと。	
禁忌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本剤の成分又は交感神経刺激アミン(メタンフェタミン、メチルフェニデート、ノルアドレナリン、アドレナリン、ドパミン等)に対し過敏症の既往歴のある患者 2. 重篤な心血管障害のある患者[血圧又は心拍数を上昇させ、症状を悪化させるおそれがある。] 3. 甲状腺機能亢進のある患者[循環器系に影響を及ぼすことがある。] 4. 過度の不安、緊張、興奮性のある患者[中枢神経刺激作用により症状を悪化させることがある。] 5. 運動性チックのある患者、Tourette 症候群又はその既往歴・家族歴のある患者[症状を悪化又は誘発させることがある。] 6. 薬物乱用の既往歴のある患者[慢性的乱用により過度の耐性及び様々な程度の異常行動を伴う精神的依存を生じるおそれがある。] 7. 閉塞隅角緑内障のある患者[眼圧を上昇させるおそれがある。] 8. 褐色細胞腫のある患者[血圧を上昇させるおそれがある。] 9. モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤(セレギリン塩酸塩、ラサギリンメシル酸塩、サフィナミドメシル酸塩)を投与中又は投与中止後2週間以内の患者[高血圧クリーゼに至るおそれがある。] 	
相互作用	高血圧クリーゼが起こるおそれ モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤;セレギリン塩酸塩(エフピー)、ラサギリンメシル酸塩(アジレクト)、サフィナミドメシル酸塩(エクフィナ) 本剤の作用増強 メチルフェニデート塩酸塩、尿のpHをアルカリ化する薬剤;炭酸水素ナトリウム等 本剤の作用減弱 尿のpHを酸性化する薬剤;アスコルビン酸等 まれにセロトニン症候群が起こるおそれ セロトニン作用薬;選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)、三環系抗うつ剤等	
副作用	重大な副作用 ショック、アナフィラキシー、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson 症候群)、心筋症、依存性 その他 頻脈、不眠、頭痛、めまい、食欲減退、悪心、腹痛、下痢、嘔吐、体重減少	

医薬品剤形・規格変更通知

今回採用医薬品(採用)	従来採用医薬品(削除)
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>4月1日より</u> サムスカ OD 錠 15mg サムスカ OD 錠 7.5mg ブレオ注射用 15mg ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」 アドベイト静注用キット 250 アドベイト静注用キット 500 アドベイト静注用キット 1000 アドベイト静注用キット 2000	サムスカ錠 15mg サムスカ錠 7.5mg ブレオ注射用 5mg ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」 アドベイト静注用 250 アドベイト静注用 500 アドベイト静注用 1000 アドベイト静注用 2000

医薬品規格追加通知

<ul style="list-style-type: none"> ● <u>4月1日より</u> オルケディア錠 2mg イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「NK」 カルセド注射用 50mg	カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」 エルプラット点滴静注液 200mg アクプラ静注用 50mg
---	---

削除医薬品通知

レグバラ錠 25mg	4/1 削除	レスタス錠 2mg	4/1 削除
S・アドクノン錠 30	4/1 削除		

販売中止に伴う医薬品変更通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>4月1日より</u> マーズレンS配合顆粒 <ul style="list-style-type: none"> ● <u>在庫消尽後</u> トコフェロール酢酸エステル錠 50mg「トーフ」	アズレン・グルタミン配合顆粒「EMEC」 ビタミンE錠 50mg「NP」

供給停止に伴う医薬品変更通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>4月1日より</u> トランサミンカプセル 250mg	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーフ」

適応追加通知

<p>ネオーラル内用液 10%</p>	<p>【効能・効果】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 下記の臓器移植における拒絶反応の抑制 腎移植、肝移植、心移植、肺移植、膵移植、小腸移植2. 骨髄移植における拒絶反応及び移植片対宿主病の抑制3. ベーチェット病(眼症状のある場合)、及びその他の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効果不十分であり、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る)4. 尋常性乾癬(皮疹が全身の30%以上に及ぶものあるいは難治性の場合)、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬5. 再生不良性貧血、赤芽球癆6. ネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイドに抵抗性を示す場合)7. 全身型重症筋無力症(胸腺摘出後の治療において、ステロイド剤の投与が効果不十分、又は副作用により困難な場合)8. アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者)9. 川崎病の急性期(重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合) <p>【用法・用量】</p> <p>1～8. 省略</p> <ol style="list-style-type: none">9. 川崎病の急性期 通常、シクロスポリンとして1日量5mg/kgを1日2回に分けて原則5日間経口投与する。
-------------------------	--