

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	エナロイ錠 2mg	劇 市販直後調査 2020年12月～2021年6月
(英名)	Enarodustat	
(規格・含有量)	1錠中エナロデュスタット 2mg 含有	
(一般名)	エナロデュスタット	
(メーカー名)	鳥居薬品株式会社	
【薬価収載日】	2020年11月	
【薬価】	1錠 275.90円	
【薬効コード】	3999	
【薬効分類名】	HIF-PH阻害薬 腎性貧血治療薬	
効能・効果	腎性貧血	
用法・用量	<p>〈保存期慢性腎臓病患者及び腹膜透析患者〉</p> <p>通常、成人には、エナロデュスタットとして1回2mgを開始用量とし、1日1回食前又は就寝前に経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1回8mgとする。</p> <p>〈血液透析患者〉</p> <p>通常、成人には、エナロデュスタットとして1回4mgを開始用量とし、1日1回食前又は就寝前に経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1回8mgとする。</p>	
禁忌	<p>本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>妊婦又は妊娠している可能性のある女性</p>	
相互作用	<p>本剤作用減弱;リン吸着薬 セベラマー塩酸塩、ピキサロマー、炭酸ランタン</p> <p>多価陽イオン(カルシウム、鉄、マグネシウム、アルミニウム等)を含有する経口製剤</p>	
副作用	<p>重大な副作用 血栓塞栓症</p>	

(薬品名)	ゼプリオン TRI 水懸筋注 263mg ・ 525mg シリンジ 劇	市販直後調査 2020 年 11 月 ~2021 年 5 月
(英名)	Paliperidone Palmitate	
(規格・含有量)	パリペリドンパルミチン酸エステル(パリペリドンとして) 263mg 製剤:410mg(263mg) 525mg 製剤:819mg(525mg)	
(一般名)	パリペリドンパルミチン酸エステル	
(メーカー名)	ヤンセンファーマ株式会社	
【薬価収載日】	2020 年 11 月	
【薬価】	263mg 製剤:84,829 円 525mg 製剤:134,858 円	
【薬効コード】	1179	
【薬効分類名】	持効性抗精神病剤	
効能・効果	統合失調症(パリペリドン 4 週間隔筋注製剤による適切な治療が行われた場合に限る)	
用法・用量	本剤は、パリペリドン 4 週間隔筋注製剤が 4 ヶ月以上継続して投与され、適切な治療が行われた患者に対し、最終投与の 4 週間後から切り替えて使用する。 通常、成人には、パリペリドンとして、パリペリドン 4 週間隔筋注製剤最終投与量の 3.5 倍量を、12 週間に 1 回、三角筋又は臀部筋に筋肉内投与する。	
禁忌	昏睡状態の患者[昏睡状態を悪化させるおそれがある。] バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者[中枢神経抑制作用が増強されることがある。] アドレナリン(アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く)、クロザピンを投与中の患者 本剤の成分、パリペリドン及びリスペリドンに対し過敏症の既往歴のある患者 中等度から重度の腎機能障害患者(クレアチニン・クリアランス 50mL/分未満)	
相互作用	血圧降下 アドレナリン(アナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く)、ボスミン、降圧薬 両剤作用増強 中枢神経抑制剤(バルビツール酸誘導体等)、アルコール 両剤作用減弱 ドパミン作動薬 本剤血中濃度低下 カルバマゼピン QT 延長 QT 延長を起こすことが知られている薬剤	
副作用	重大な副作用 悪性症候群(Syndrome malin)、遅発性ジスキネジア、麻痺性イレウス、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)、肝機能障害、黄疸、横紋筋融解症、不整脈、脳血管障害、高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡、低血糖、無顆粒球症、白血球減少、肺塞栓症、深部静脈血栓症、持続勃起症、アナフィラキシー	

(薬品名)	コムクロシャンプー0.05% 劇
(英名)	Clobetasol Propionate
(規格・含有量)	1g 中日局クロベタゾールプロピオン酸エステル 0.5 mg 含有
(一般名)	クロベタゾールプロピオン酸エステル
(メーカー名)	マルホ株式会社
【薬価収載日】	2017年5月
【薬価】	1g 24.70円
【薬効コード】	2646
【薬効分類名】	外用合成副腎皮質ホルモン剤
効能・効果	頭部の下記疾患 尋常性乾癬、湿疹・皮膚炎
用法・用量	通常、1日1回、乾燥した頭部に患部を中心に適量を塗布し、約15分後に水又は湯で泡立て、洗い流す。
禁忌	本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 頭部に皮膚感染症のある患者〔感染を悪化させるおそれがある〕 頭部に潰瘍性病変のある患者〔皮膚の再生が抑制され、治癒が遅れるおそれがある〕
相互作用	記載なし
副作用	記載なし

(薬品名)	イスパロクト静注用 2000・3000 生物
(英名)	Turoctocog Alfa Pegol (Genetical Recombination)
(規格・含有量)	1パイアル中ツロクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)2,000・3,000国際単位
(一般名)	ツロクトコグ アルファ ペゴル(遺伝子組換え)
(メーカー名)	ノボルディスクファーマ株式会社
【薬価収載日】	2019年11月
【薬価】	1瓶 2000単位;230,339円 3000単位;329,913円
【薬効コード】	6349
【薬効分類名】	ペグ化遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子製剤
効能・効果	血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制
用法・用量	本剤を添付の専用溶解液全量で溶解し、1~2mL/分で緩徐に静脈内に注射する。 通常、1回体重1kg当たり10~30国際単位を投与するが、患者の状態に応じて適宜増減する。 定期的に投与する場合、12歳以上の患者には、通常、1回体重1kg当たり50国際単位を4日毎に投与する。なお、患者の状態に応じて、1回体重1kg当たり50国際単位を週2回、又は1回体重1kg当たり75国際単位を週1回投与することもできる。 12歳未満の小児には、通常、1回体重1kg当たり60国際単位を週2回投与する。なお、患者の状態に応じて、1回体重1kg当たり50~75国際単位を週2回又は3日毎に投与することもできる。
禁忌	記載なし
相互作用	記載なし
副作用	重大な副作用 ショック、アナフィラキシー

削除医薬品通知

ノボエイト静注用 1000	5/7 削除
ノボエイト静注用 1500	5/7 削除
リスパダール コンスタ筋注用 25mg	5/7 削除
リスパダール コンスタ筋注用 37.5mg	5/7 削除
ビスダーム軟膏 5g	5/7 削除
イーフェンバツカル錠 50 μ g	5/7 削除

後発医薬品採用通知

変更後	変更前
● <u>5月7日より</u> ガラタミン OD 錠 4mg「DSEP」	レミニール OD 錠 4mg

販売名変更医薬品通知

変更後	変更前
● <u>在庫消尽後</u> モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg「フジモト」	モルペス細粒 2%

規格追加医薬品通知

ラツータ錠 80mg	5/7 採用
ゼプリオン水懸筋注 50mg シリンジ	5/7 採用

適応追加通知

献血グロベニン-I 静注用 2500mg 5000mg	<p>【効能・効果】</p> <ul style="list-style-type: none">◇無又は低ガンマグロブリン血症◇重症感染症における抗生物質との併用◇特発性血小板減少性紫斑病（他剤が無効で、著明な出血傾向があり、外科的処置又は出産等一時的止血管理を必要とする場合）◇川崎病の急性期（重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合）◇慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（多巣性運動ニューロパチーを含む）の筋力低下の改善◇慢性炎症性脱髄性多発根神経炎（多巣性運動ニューロパチーを含む）の運動機能低下の進行抑制（筋力低下の改善が認められた場合）◇天疱瘡（ステロイド剤の効果不十分な場合）◇スティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症（ステロイド剤の効果不十分な場合）◇水疱性類天疱瘡（ステロイド剤の効果不十分な場合）◇ギラン・バレー症候群（急性増悪期で歩行困難な重症例）◇血清 IgG2 値の低下を伴う、肺炎球菌又はインフルエンザ菌を起炎菌とする急性中耳炎、急性気管支炎又は肺炎の発症抑制（ワクチン接種による予防及び他の適切な治療を行っても十分な効果が得られず、発症を繰り返す場合に限る）◇多発性筋炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善（ステロイド剤が効果不十分な場合に限る） <p>【用法・用量】</p> <ul style="list-style-type: none">◇多発性筋炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善： 通常、成人には 1 日に人免疫グロブリン G として 400mg(8mL)/kg 体重を 5 日間点滴静注する。◇他.省略
--------------------------------------	--