

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	エネフリード輸液 550mL
(組成)	糖質;37.5g・遊離アミノ酸;15g・脂質;10g・総熱量;310kcal
(メーカー名)	大塚製薬工場
【薬価収載日】	2020年11月
【薬価】	1キット 1,048円
【薬効コード】	3259
【薬効分類名】	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・水溶性ビタミン液
効能・効果	下記状態時のアミノ酸、電解質、カロリー、脂肪酸、水溶性ビタミン及び水分の補給 <ul style="list-style-type: none"> ・ 経口摂取不十分で、軽度の低蛋白血症又は軽度の低栄養状態にある場合 ・ 手術前後
用法・用量	通常、成人には1回550mLを末梢静脈内に点滴静注する。投与速度は、通常、成人550mL当たり120分を基準とする。 なお、症状、年齢、体重に応じて適宜増減するが、最大投与量は1日2200mLまでとする。
禁忌	<p>重篤な肝障害、肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者</p> <p>重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) [水分、電解質の過剰投与に陥りやすく、症状が悪化するおそれがある。また、アミノ酸の代謝産物である尿素等が滞留し、症状が悪化するおそれがある。]</p> <p>乏尿のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く)[高カリウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]</p> <p>うっ血性心不全のある患者[循環血液量を増すことから心臓に負担をかけ、症状が悪化するおそれがある。]</p> <p>高度のアシドーシス(高乳酸血症等)のある患者[症状が悪化するおそれがある。]</p> <p>高カリウム血症、アジソン病の患者[高カリウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]</p> <p>高リン血症、副甲状腺機能低下症の患者[高リン血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]</p> <p>高マグネシウム血症、甲状腺機能低下症の患者[高マグネシウム血症が悪化する又は誘発されるおそれがある。]</p> <p>高カルシウム血症の患者[高カルシウム血症が悪化するおそれがある。]</p> <p>閉塞性尿路疾患により尿量が減少している患者[水分、電解質の過負荷となり、症状が悪化するおそれがある。]</p> <p>アミノ酸代謝異常症の患者[投与されたアミノ酸が代謝されず、症状が悪化するおそれがある。]</p> <p>血栓症の患者[凝固能亢進により症状が悪化するおそれがある。]</p>

	<p>重篤な血液凝固障害のある患者[出血傾向があらわれるおそれがある。]</p> <p>血友病の患者[出血時間を延長することがある(パンテノール含有のため)。]</p> <p>ケトースを伴った糖尿病の患者[ケトースが亢進するおそれがある。]</p> <p>重度の高脂血症の患者[高脂血症を助長させるおそれがある。]</p> <p>本剤又は本剤配合成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p>
相互作用	他剤作用減弱 パーキンソン病治療薬;レボドパ ワルファリンカリウム
副作用	重大な副作用 静脈塞栓、ショック、アナフィラキシー その他 肝機能異常、注射部位静脈炎

(薬品名)	ラニズマブ BS 硝子体内注射用キット 10mg/mL 「センジュ」 劇
(英名)	Ranibizumab (Genetical Recombination) [Ranibizumab Biosimilar 1]
(規格・含有量)	1 キット(0.165mL) 中、ラニズマブ(遺伝子組換え)[ラニズマブ後続 1]1.65mg を含有
(一般名)	ラニズマブ(遺伝子組換え)[ラニズマブ後続 1]
(メーカー名)	千寿製薬
【薬価収載日】	2021 年 11 月
【薬価】	1 筒 79,348 円
【薬効コード】	1319
【薬効分類名】	眼科用 VEGF 阻害剤
効能・効果	中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 病的近視における脈絡膜新生血管
用法・用量	<p>〈中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性〉</p> <p>ラニズマブ(遺伝子組換え)[ラニズマブ後続 1]として 0.5mg(0.05mL)を 1 ヶ月毎に連続 3 ヶ月間(導入期) 硝子体内投与する。その後の維持期においては、症状により投与間隔を適宜調節するが 1 ヶ月以上の間隔をあけること。</p> <p>〈病的近視における脈絡膜新生血管〉</p> <p>ラニズマブ(遺伝子組換え)[ラニズマブ後続 1]として 1 回あたり 0.5mg(0.05mL)を硝子体内投与する。投与間隔は、1 ヶ月以上あけること。</p>
禁忌	<p>本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>眼又は眼周囲に感染のある患者、あるいは感染の疑いのある患者[眼内炎等の重篤な副作用が発現するおそれがある。]</p> <p>眼内に重度の炎症のある患者[炎症が悪化する可能性がある。]</p>
相互作用	記載なし
副作用	<p>重大な副作用 眼障害、脳卒中</p> <p>その他 眼炎症(虹彩炎、硝子体炎、虹彩毛様体炎、ブドウ膜炎、前房蓄膿、前房の炎症)、結膜出血、眼圧上昇、眼刺激、眼の異物感、流涙増加</p>

後発品医薬品採用通知

変更後	変更前
● <u>5月10日より</u> ピレノキシシ懸濁性点眼液 0.005%「参天」 5mL	カタリン K 点眼用 0.005% 15mL

供給不足による医薬品変更通知

変更後	変更前
● <u>在庫消尽後</u> アルファカルシドール錠 0.5 µg「アメル」	アルファカルシドールカプセル 0.5 µg「あすか」

医薬品変更通知

変更後	変更前
● <u>在庫消尽後</u> ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「日医工」	ニカルジピン塩酸塩注 10mg「タイヨー」
● <u>4月15日変更済</u> ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「第一三共」

削除医薬品通知

フェロン注射用 300 万	製造中止のため、2022 年 3 月 削除
---------------	-----------------------