

# 新規採用・削除医薬品等通知

## 新規採用医薬品通知

(薬品名)	ジーラスタ皮下注 3.6mg ボディーポッド
(英名)	Pegfilgrastim (Genetical Recombination)
(規格・含有量)	1キット中 ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)3.6mg 含有
(一般名)	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)
(メーカー名)	協和キリン
【薬価収載日】	2022年11月
【薬価】	1キット 114,185円
【薬効コード】	3399
【薬効分類名】	持続型 G-CSF 製剤
効能・効果	がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制
用法・用量	通常、成人にはがん化学療法剤投与終了後の翌日以降、ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)として、3.6mgを化学療法1サイクルあたり1回皮下投与する。
禁忌	本剤の成分又は他の顆粒球コロニー形成刺激因子製剤に過敏症の患者 骨髄中の芽球が十分減少していない骨髄性白血病の患者及び末梢血液中に骨髄芽球の認められる骨髄性白血病の患者
相互作用	記載なし
副作用	<b>重大な副作用</b> ショック、アナフィラキシー、間質性肺疾患、急性呼吸窮迫症候群、芽球の増加、脾腫・脾破裂、毛細血管漏出症候群、Sweet 症候群、皮膚血管炎、大型血管炎(大動脈、総頸動脈、鎖骨下動脈等の炎症)

(薬品名)	ソーテイクツ錠 6mg 劇 市販直後調査 2022 年 11 月～2023 年 5 月
(英名)	Deucravacitinib
(規格・含有量)	1 錠中 デュークラバシチニブ 6mg 含有
(一般名)	デュークラバシチニブ
(メーカー名)	ブリistol・マイヤーズ スクイブ
【薬価収載日】	2022 年 11 月
【薬価】	1 錠 2,770.90 円
【薬効コード】	3999
【薬効分類名】	チロシンキナーゼ 2(TYK2)阻害剤
効能・効果	既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症
用法・用量	通常、成人にはデュークラバシチニブとして 1 回 6mg を 1 日 1 回経口投与する。
禁忌	重篤な感染症の患者[症状を悪化させるおそれがある] 活動性結核の患者[症状を悪化させるおそれがある] 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
相互作用	記載なし
副作用	<b>重大な副作用</b> 重篤な感染症

(薬品名)	エヌジェンラ皮下注 60mg ペン 生物
(英名)	Somatrogen
(規格・含有量)	1 キット中 ソムアトロゴン (遺伝子組換え)60mg 含有
(一般名)	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)
(メーカー名)	ファイザー
【薬価収載日】	2022 年 4 月
【薬価】	1 キット 107,580 円
【薬効コード】	2412
【薬効分類名】	長時間作用型遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤
効能・効果	骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症
用法・用量	通常、ソムアトロゴン(遺伝子組換え)として 0.66mg/kg を 1 週間に 1 回皮下投与する。
禁忌	本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 悪性腫瘍のある患者[成長ホルモンが細胞増殖作用を有するため。]
相互作用	<b>他剤の作用減弱のおそれ</b> 主に CYP3A で代謝される薬剤(性ホルモン製剤、抗てんかん薬、シクロスポリン等) <b>成長ホルモンの成長促進作用が抑制されるおそれ</b> 糖質コルチコイド <b>血清コルチゾール濃度が低下するおそれ</b> 糖質コルチコイド <b>成長ホルモンの成長促進作用が抑制されるおそれ</b> 経口エストロゲン

	<p><b>血糖値が上昇するおそれ</b> 糖尿病用薬(インスリン製剤、ピグアナイド系薬剤、スルホニルウレア剤、速効型インスリン分泌促進薬、<math>\alpha</math>-グルコシダーゼ阻害剤、チアゾリジン系薬剤、DPP-4 阻害剤、GLP-1 受容体作動薬、SGLT2 阻害剤等)</p> <p><b>甲状腺機能低下が顕在化又は悪化するおそれ</b> 甲状腺ホルモン</p>
副作用	<p><b>重大な副作用</b> 痙攣、甲状腺機能亢進症、ネフローゼ症候群、糖尿病</p> <p><b>その他</b> 注射部位疼痛、</p>

(薬品名)	ナゾラ皮下注 30mg シリンジ 劇・生物 市販直後調査 2022 年 12 月～2023 年 5 月
(英名)	Ozoralizumab (Genetical Recombination)
(規格・含有量)	1 筒中 オゾラリズマブ(遺伝子組換え) 30mg 含有
(一般名)	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)
(メーカー名)	大正製薬
【薬価収載日】	2022 年 11 月
【薬価】	1 筒 112,476 円
【薬効コード】	3999
【薬効分類名】	TNF $\alpha$ 阻害薬(一本鎖ヒト化抗ヒト TNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤)
効能・効果	既存治療で効果不十分な関節リウマチ
用法・用量	通常、成人にはオゾラリズマブ(遺伝子組換え)として 1 回 30mg を 4 週間の間隔で皮下投与する。
禁忌	<p>重篤な感染症(敗血症等)の患者[症状を悪化させるおそれがある。]</p> <p>活動性結核の患者[症状を悪化させるおそれがある。]</p> <p>本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者</p> <p>脱髄疾患(多発性硬化症等)及びその既往歴のある患者[症状の再燃及び悪化のおそれがある。]</p> <p>うっ血性心不全の患者</p>
相互作用	記載なし
副作用	<p><b>重大な副作用</b> 重篤な感染症、結核、ループス様症候群、間質性肺炎、脱髄疾患、重篤なアレルギー反応、重篤な血液障害</p>

(薬品名)	<b>リバゼブ配合錠 LD ・ リバゼブ配合錠 HD</b>
(英名)	Pitavastatin Calcium Hydrate/Ezetimibe
(規格・含有量)	1錠中 ピタバスタチンカルシウム/エゼチミブとして、2.0mg/10.0mg(LD) 、4.0mg/10.0mg(HD) 含有
(一般名)	ピタバスタチンカルシウム/エゼチミブ
(メーカー名)	興和
【薬価収載日】	2022 年 11 月
【薬価】	1錠 87.80 円(LD) 、116.00 円(HD)
【薬効コード】	2189
【薬効分類名】	HMG-CoA 還元酵素阻害剤/小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤
効能・効果	高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症
用法・用量	通常、成人には 1 日 1 回 1 錠(ピタバスタチンカルシウム/エゼチミブとして 2mg/10mg 又は 4mg/10mg)を食後に経口投与する。
禁忌	本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 重篤な肝機能障害又は胆道閉塞のある患者 シクロスポリンを投与中の患者 妊婦又は妊娠している可能性のある女性及び授乳婦
相互作用	<b>急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症等の重篤な有害事象が発現するおそれ</b> シクロスポリン(サンディミュン、ネオーラル)、フィブラート系薬剤(ベザフィブラート等)、ニコチン酸、エリスロマイシン <b>本剤の作用減弱のおそれ</b> 陰イオン交換樹脂(コレステチミド、コレステラミン等) <b>本剤の作用増強のおそれ</b> リファンピシン <b>プロトロンビン時間国際標準比(INR)上昇のおそれ</b> クマリン系抗凝固剤(ワルファリン等)
副作用	<b>重大な副作用</b> 過敏症、横紋筋融解症、ミオパチー、免疫介在性壊死性ミオパチー、肝機能障害、黄疸、血小板減少、間質性肺炎

## 削除医薬品通知

グラン 75 µg皮下注シリンジ	在庫消尽後削除
ヒューマトロブ注射用 12mg	2/1 削除
ソロンカプセル 100	2/1 削除

## 後発医薬品採用通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>2月1日より</u>                      ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」                      リファンピシカプセル 150mg「サンド」                      シタフロキサシン錠 50mg「サワイ」                      ケトコナゾールクリーム 2%「NR」                      イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「TC」                      フルニトラゼパム錠 2mg「アメル」</li> </ul>	リンデロン錠 0.5mg リファジンカプセル 150mg グレースビット錠 50mg ニゾラルクリーム 2% エパデール S900 サイレース錠 2mg

## 供給不足及び販売中止による医薬品変更通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>1/6より変更済み</u>                      ニカルジピン塩酸塩注 10mg「タイヨー」</li> <li>● <u>在庫消尽後</u>                      アロプリノール錠 50mg「ケミファ」                      サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「テバ」</li> </ul>	ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「日医工」 アロプリノール錠 50mg「タナベ」 サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「F」

## 供給不足解消による医薬品変更通知

変更後	変更前
● <u>2月1日より</u> トリクロルメチアジド錠 2mg「タイヨー」	トリクロルメチアジド錠 2mg「JG」

## 医薬品供給再開通知

ネバナック懸濁性点眼液 0.1%

12/23 より再開済み

## 適応追加通知

ラニズマブ BS 硝子体内注射用キット 10mg/mL「センジュ」	<b>【効能・効果】</b> 中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 病的近視における脈絡膜新生血管 <b>糖尿病黄斑浮腫</b> <b>【用法・用量】</b> 〈病的近視における脈絡膜新生血管、 <b>糖尿病黄斑浮腫</b> 〉 <b>ラニズマブ(遺伝子組換え)[ラニズマブ後続 1]として1回あたり 0.5mg(0.05mL)を硝子体内投与する。投与間隔は、1ヵ月以上あけること。</b> 〈他〉省略
---	--